




BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III


XXV


A

48
NAPOLI











GULIELMI BRIGGS
OPHTHALMO-GRAPHIA

accessit

EIUSDEM AUCTORIS

NOVA VISIONIS THEORIA

LUGD·BATAV·

APUD PETRUM VANDER A.A.



GUILIELMI BRIGGS

*Med. Doct. Colleg. Med. Londin. Soc. &
Nosocomii Regal. (quod D. Thoma dica-
tum est) Medici Ordinarii,*

OPHTHALMŌ-GRAPHIA,

sive

Oculi ejusque partium
descriptio anatomica,

Nec Non,

EJUSDEM

NOVA VISIONIS THEORIA;

*Regiæ Societati Londinensi
proposita.*



LUGD. BATAVOR.

Apud PETRUM vander Aa,

M. DC. LXXXVI.



AUGUSTISSIMO.
MONARCHÆ.

JACOBO. II.

MAGNÆ. BRITANNIÆ.
FRANCIÆ. ET. HIBER-
NIÆ. REGI. &c.

TUTELARI. PATRIÆ. GE-
NIO. QUAM. (SPRETA. SA-
LUTE. PROPRIA.) SÆ-
PIUS. SERVAVIT.

MONARCHIÆ. VETERIS.
STATORI. ET. VINDICI.
NUTANTIS. IMPERII. CÆ-
LITUS. DEMISSO.

ARTIUM. PRÆSTANTIO-
RUM. FAUTORI. ET. PA-
TRONO. OPTIMO.

HUMILLIME. DICAT.
CONSECRATQUE.

SUBDITUS. DEVOTISSIMUS.

GUIL. BRIGGS.

GUILIELMI BRIGGS


Med. Doct. Lond.

Ophthalamo-graphia


S I V E

**Oculi ejusque partium
descriptio**

ANATOMICA.



PRÆFATIO.

 *Esco qualem sortem habitura est (benevole Lector) proles hac exigua, quæ præsertim feto hoc Anatomicorum seculo in lucem prodit. Enimverò nunquàm ardentiori studio corporis humani partes evolutæ sunt, aut feliciori industriâ sinuosi Nature tramites indagati. Nullis sanè parcendum est curis aut laboribus dum salutis*
A 5 *humana-*

Præfatio.

humanae prospicimus, aut immensi Conditoris nostri gloriæ ullatenus inservimus. Dum verò indies, superstitum gratiâ, capulus feralis inspicitur, dum aliæ Microcosmi partes sedulò satis excutiuntur; pulcherrimum interim hoc visionis Organon perfunctoriè nimis (ut mihi visum est) ab authoribus illustratur. Pars sanè Optices Mathematica à Clariss. viris Merfенno, Keplero, Aguilonio, Nicerone, &c. uberiùs excolitur; pensum verò Anatomicum ab iisdem in-
tran.

Præfatio.

transitu tantum & parcius attingitur. Pauci interim illi, qui ex professo huic studio incubuerunt., vel observationes suas Veterum Philosophiæ & placitis submiserè (præcipuè dum de coloribus Iridis, primario visionis Organo, &c. disserunt) vel partes aliquas, vasa nempe lymphatica & veram lachrymarum, æquè ac Nili, originem ignorarunt. Cogitabam itaque sæpiùs hanc partem (quæ inter nobiliora corporis membra meritò recensetur, & cujus cognitio tam Mathesi
A 6 *quàm*

Præfatio.

quàm Physicæ utilis videatur) scrutinium diligentius efflagitare.

Quamobrem diu exoptavi, ut alii (quos nec annis, nec exercitatione diuturnâ ex æquo) huic muneri insudarent; quod si fecissent, hoc sanè opusculum intra proprios lares delitasset ulterius, & ejusdem author mutas hasce artes clàm tantùm & inglorius libentè agitasset.

*Hanc itaque Spartam ab aliis neglectam excolere studui; in quâ si quid profecerim, it-
lud*

Præfatio.

*lud summæ benevolentia do-
ctissimi dexterrimique Anato-
mici D. Vieussenii M. D.
& in celeberrimâ Academiâ
Monspeliensi Practici eximii,
me magnâ ex parte debere gra-
tus agnosco: Ille enim ingenti,
quâ pollebat, humanitate mihi
primùm elegantem partium
structuram & labyrintheos
flexus ostendit, perjucundam
œconomia animalis notitiam
ultrò instillavit, & universa
corporis humani stamina sum-
mo mentis & cultri acumine
exhibuit: Ipse quidèm animum*

Præfatio.


*ad hosce conatus primus accendit, & me alia ferè cogitantem blandis studiorum & amicitiae commerciis sibi devinxit, adeò ut sæpè in Paradiso illâ terrestri, spretis Jasmmini, Balsamitæ & serpylli odoribus (quos felix illud solum passim exhalat) posthabitisque cæteris fœmineis oblectamentis, tetra quidè No-
socomii theatrîque Anatomici limina, non exiguâ voluptate, pertransivimus.*

*Hisce auspiciis instructus rei Anatomicæ incubui, &
in*

Præfatio.

in contemplatione mirandæ hujus organi visorii structuræ (partim rerum pulchritudine, & partim difficultate detentus) diutiùs hæsi. Quo verò successu hæc omnia peregi, penes te est (Lector ingenue) decernere: spero interim quòd conjecturas, quas de Iride, diversâ humorum densitate, separatione lymphæ, Musculorum motu, &c. (magnaliis illis Naturæ) hæsitantèr proposui, æquo animo expendes, aut proferes saltèm meliores. Vale.

OPHTHAL-





OPHTHALMO- GRAPHIA,

S I V E

Oculi ejúsque par-
tium descriptio

ANATOMICA.

CAP. I.

De Oculo in genere.

INter præcipuas i. Oculi
corporis anima. præstan-
ti partes, quæ^{tia.}
magni Conditoris no-
stri.

stri sapientiam ostendunt: nulla sanè reperitur, quæ majori pompâ elucet (quam ipse oculus) aut quæ elegantiori formâ concinnatur. Dum enim aliæ partes vel minori satellitio stipantur, vel in tantam venustatem haud assurgunt; Ocelli peculiarem honorem & decus à supremo Numine afflatum referunt, & nunquam non stupendæ suæ potentiae characteres præsentant. Nulla sanè pars tam divino artificio & ordine musculos suos & humores complectitur, nec tam ingenti

genti vasorum & membranarum apparatu instruitur : In Oculi enim fabricam conspiciant muscoli , tunicæ , humores , arteriæ , venæ , nervi tam motui quàm sensui inservientes , vasa lymphatica , & glandulæ. Quibus accedant aliæ partes extrinsecæ , quæ non ad essentiam Oculi spectant; quæ verò vel ad motum , vel ad commoditatem suam aliquatenus , à provido & sagaci Naturæ authore efformantur , quales sunt pinguedo , palpebræ , cilia , supercilia , puncta.

Partes propria.
Adscititia.

20. *De Oculo in genere.*

puncta lachrymalia, item os sive finus in quo continetur. Hisce verò (utpote fatis notis atque extra Oculi pomæria, & penfi nostri rationem constitutis) non necesse est ut immoremur.

2. *Figura* Oculi figura ad motum suum optimè cinnatur, licet non sit exactè sphærica; pars enim antica (sive cornea) convexior est posticâ: hâc enim ratione radii meliùs in pupillam detorquentur, & Oculi fundus ex alterâ parte in majorem sphæram (pro-

(propter imagines rerum ibidem delineandas) expanditur.

Situs Oculorum maxime congruus est, Primo, Quod debitam distantiam inter se servant, quæ si minor foret non ritè cernerentur objecta lateralìa; si verò major, non tam commodè in ejusdem rei intuitu consentirent. Secundo, Quod sint in æquilibrio positi; ita ut radiorum ab objecto unico vibrationes per filamenta nervorum opti-
corum homologa (quæ Inspic. nempe ad amussim sibi fig. 4. mutuo

22 *De Oculo in genere.*

mutuo respondent) ad cerebrum traducantur; indéque Anima nostra (veluti cum duæ citharæ chordæ unisonæ simul pulsantur) unicum tantum motum persentiscit. Ita porro nervi motorii (versus origines suas sociati) ad Oculos deferuntur, ut uno Oculo moto alter statim in eandem Cœli plagam collimet. Constat enim ex mutato hoc situ, sc. uno Oculo depresso (sive non in eodem plano cum altero existente) objectum in diverso situ apparere; eò quod radii non incidunt in fibras

bras utriusque retinæ analogas, atque hinc duæ diversæ sensationes in cerebro producuntur, Si enim Oculus dexter (sinistro prius occluso) deprimatur, statim (aperto hoc) objectum in situm altiorem videbitur assurgere. Hinc etiam ratio apparentiæ objecti (à presso Oculo) duplicatæ desumenda est; quæ non ab eo pendet (ut vulgò perhibetur) quod conus refractus hâc pressione in duas partes dirimitur, quæ ideo in diversis retinæ ejusdem filamentis terminari supponuntur; sed

sed potius ex eo quod radii fibras inde retinæ utriusque *discordes* percutiunt : quoniam hæc duplicatio eodem momento, quo oculus non pressus occluditur, evanescit. Hoc verò strabonibus non contingit licet eorum oculi prædicto more non librentur, quoniam eorundem axes optici in diversas Cœli regiones (propter pravam musculorum contorsionem) semper intenduntur; ita ut radii ab unico objecto provenientes ab uno tantum oculo excipiantur, ideóque duas diversas

verfas sensationes minimè producant. Dum itaque strabismo laborans viris duobus occurrit axes opticos simul in utroque torquet, ut incertum sit dignoscere quemnam eorum potius alloquatur.

Molem Oculi resp. 4. Magnitudo.
ætu objectorum visibilia. nitudo.
lium exiguam agnoscimus: hanc verò compensant tunicæ corneæ convexitas & humorum refringentium indoles, undè radii complures ad retinam detorquentur, Nec minimum huc
B con-

26 *De Oculo in genere.*

confert musculorum
congruus apparatus ;
quo statim partes obje-
cti licet immensi suc-
cessivè percurrimus , &
Coeli terræque plagas
facili negotio perlustra-
mus.

CAP.



CAP. II.

*De Oculi partibus, &
speciatim de Muscu-
lis.*

Præmissis jam genera-
li Oculi examine par-
tes ejusdem proximè e-
volvendæ sunt, ut di-
versa earum munia lu-
culentiùs explicentur.
Inter has verò 1^o confi-
derandi sunt musculi,
qui pinguedine obvolu-
ti primariam Anatomi-

i. Mus-
culorum
situs.

28 *De Oculi partibus,*

ci diligentiam in eorum
separatione deprecantur.
Sublatâ itaque cautè
tunicâ adnatâ sive com-
muni & pinguedine, hi
statim in conspectum
veniunt.

2. Nu-
merus, Eorum sex in homi-
ne annumerantur; 1.
Attollens, qui antago-
nistâ suo major est (uti
è fig. 1. apparet) forsitan
quia validiori nixu ad
oculum attollendum o-
pus est. 2. Deprimens
huic oppositus. 3. Ad-
ducens, qui ad angu-
lulum internum situm
habet; & 4. Abducens,
qui ad externum mo-
vetur.

vetur. Hi quatuor fibris
rectis donantur & à fun-
do Oculi oriundi sub
adnatâ tunicâ repunt &
tendinum ope in par-
tem Oculi anteriorem
inferuntur. Ab horum
mutuâ *συμπαράξ* oritur
aliquando illa partium
Oculi *ισορροπία*, (quæ im-
propriè motus tonicus
appellatur) quâ fixi &
attenti in objecti alicu-
jus contemplatione diu-
tiùs hæremus; quo tem-
pore æqualis spirituum
vis singulis impenditur,
ut unus aliis quoad im-
petum suum non præ-
polleat.

Duo reliqui Musculi obliqui, à fibrarum ductu, denominantur; quorum motus in amafsiis & moribundis maxime conspicui sunt: uti elegantissime à poeta (lib. 4^{to}. *Æneid.*) describuntur; ubi ait quod Dido infelici amoris suo succumbens

— *Oculis errantibus
alto*

*Quæsit Cælo lucem, in-
gemuitque repertâ.*

vid. fig. Horum enim unus,
1. qui superiorem locum sortitur (& communi principio cum prædictis musculis ortus Oculum

Ium ad angulum inter-
num torquet) nervo pa-
thetico, à Clariss. *Wil-* Lib. de
liso optimè descripto Cereb.
donatur. Anatom.
cap. 21.

Trochleâ munitur ad
strabismi periculum in
infantili ætate præca-
vendum; quæ Chirur-
gis in fistulâ lachrymalî
curandâ negotium ali-
quando faceffit. Alter
inferior qui Oculum ad
angulum externum vol-
vit, è peculiari forami-
ne egressus musculum
deprimentem superat,
& juxta abducentis ten-
dines inseritur.

Præter hos musculos alii duo in Brutis reperiuntur, quorum alius membranofus (feu niftitans) dictus pulveris & ftipularum injuriæ opponitur. Alter fufpenforius malè ab Authoribus appellatur; quia brutorum Oculi per tunicam adnatam musculos, & nervos orbitis suis fatis alligati, ab omni prolapsus discrimine prohibentur.

*Ufus
musculi
Sufpen-
forii.*

Probabilius itaque est hunc musculum nervi Optici actionem (per vices) confirmare, ne à prono brutorum incessu & copiofo affluxu humo-

humorum debilitetur.

Motus musculorum 3. *Mo-*
à spiritibus per nervos ^{*ius.*}
delatis (modo inferius
Cap. 5. describendo)
peragitur. Nervus enim
sexti paris musculo ab-
ducenti & suspensorio
impenditur; Patheticus
verò trochleari prospic-
it; Nervus denique
tertii paris in reliquos
absumitur.

Horum nervorum fi- 4. *Ufus.*
bræ ad musculorum ^{*r.*}
corpora accedentes in ^{*Inspic.*}
plures propagines dif- ^{*fig. 1.*}
cedunt, quò major spi-
rituum copia iisdem e-
B 5 largi-

34 *De Oculi partibus,*

largitur : qua deficiente (uti à morbis , inedia , vigiliis , & studiis immodicis assolet) musculi flaccescunt nimis & relaxantur , indéque ægrè admodum Oculos in diversa objecta contorquemus. Quatenus interim hæ fibræ juxta musculorum introitum densiùs agglomerantur & ad se invicem magis accedunt , hinc forsitan usum sphincteris præstant & spirituum regressum aliquatenus remorantur. Quod mihi magis probabile videtur quam sententia illa Clariss. *Cartesii* de valvulis,

*Lib. de
Hom.*

vulis , quæ nullâ hæc-
nus autopsiâ confirma-
tur.

Præter prædictum 5. *Uf.2.*
musculorum usum , a-
lius à quibusdam assi-
gnatur ; quo tam sensui
quam motui (humori
nempe crySTALLINO , seu
potius ligamento cilia-
ri) inservire supponun-
tur. Verisimile enim est
musclos quatuor re-
ctos simul contractos
oculum complanare, si-
ve humorem crySTALLI-
num in visione objecti
propinqui (quum *peni-
cillus opticus* brevior exi-
stet) retinæ adducere :

B 6 obli-

36 De Oculi partibus, &c.

obliquos è contra simul
agentes oculum elon-
gare , five humorem
cristallinum , in visione
objecti remotioris à re-
tinâ protrudere ; ne ali-
ter apex *coni refracti* ul-
tra retinam protenda-
tur.

C A P.



CAP. III.

*De Membranis sive Tun-
nicis.*

A musculorum scruti-
 tinio ad membranas
 sive involucria oculi de-
 veniendum est, quæ tri-
 nos ejusdem humores
 blandè foveant & tuen-
 tur.

Membranæ propriè
 loquendo (adnatâ sive
 communi exceptâ) dun-
 taxat

2. Mem-
 brana-
 rum nu-
 merus.

B 7

38 *De Membr. five Tunic.*

taxat tres sunt è triplici nervi visorii substantiâ enatæ. Cùm enim quilibet nervus è duabus tunicis & medullâ interiori constet; hæc proculdubio constituit mucosam retinæ substantiam, illæ scleroticam & Uveam efformant. Hyaloïdes interim five vitrea nullibi reperitur; nec sanè humor crystal-
linus, nisi aëri diutius expositus, vel leniter coctus (instar lactis) cuticulam acquirit; quæ verò improprie tunica aranea dicitur, cùm sit tantum adventitia; ut in Oculo bovis recens
execto

De Membr. five Tunic. 39

execto appareat. Fal-
litur itaque doctissim.

Mersennus dum uveam *Optic.*

& choroeidem diversas *lib: 1.*

tunicas fingit; quum *par. 3.*

hæc duo vocabula ean-
dem membranam desi-

gnant: quæ quoad par-

tem posticam & anti-

cam diversimodè appa-

ret. Idem dicendum

est de tunicâ scleroticâ,

quæ in parte Oculi an-

teriori cornea appella-

tur; & nihil aliud mihi

videtur esse quàm diver- *Substan-*

sæ fibræ motrices è scle- *tia tuni-*

rode transeuntes, quæ *ca cor-*

(sicut pellucidi muscu- *nea ten-*

lorum tendines) aptè *dinea.*

sibi invicem appositæ

radi-

40 De Membr. sive Tunica.

radios lucis facile transmittunt.

3. *Tunica adnata.* Tunica adnata (quæ album Oculi constituit) à pericranio ortum habet, & ad regionem iridis terminatur, venulis & arteriolis plurimis donatur quæ in Ophthalmiâ, à copioso sanguinis affluxu distentæ, satis dilucidè apparent. Huic alii addunt membranam innominatam; quæ tenuis tantum expansio est tendinum musculorum sub albagineâ desinentium.

De Membr. five Tunic. 41

Amotâ tunicâ adna- 4. Cor-
tâ (seu communi) & re-^{nea.}
fectis musculis statim
sclerotica apparet; cu-
jus pars anterior, cor-
nea dicta, è tribus tendi-
nibus seu lamellis con-
stat; quæ in Oculo co-
cto vel bovino recens
extracto facile separan-
tur. Ex hujus tunicæ fi-
gurâ vitiatâ oriuntur
forsan Irides vel coro-
næ circa candelam; qua-
les insigniss. *Cartesius*,
cap. 9. lib. de Meteor.
describit. Quas etiam
expertus est alius mihi
intimè notus, qui, cum
totam ferè noctem dex-
træ innixus transiisset,
se-

42 *De Membr. sive Tunica.*

sequenti aurorâ (dum crebrò ad lucernam attendit) pulcherrimum hoc phænomenon (quod oculum solummodo pressum seu dextrum, finistrum verò neutiquam, affecit) per spatium sex horarum aut amplius observavit. Primò enim magnum amœnissimæ viriditatis circulum (aliud subflavum includentem) postea verò rubrum, priori supervenientem, aspexit: Qui circuli, spatio prædicto elapso, tandem evanuerunt. Tunica enim cornea hoc ritu diutiùs compressa
 rugas.

rugas forsan circulares contraxit, quæ inde diversimodè radios transeuntes ad retinam detorserunt. A majori nempe eorum refractione oriebatur forsan circulus viridis, alium minus refractum includens; deinde (corneæ rugis ferè deletis) circulus ruber à minima refractione radiorum apparuit. Quod verissimilius mihi videtur, quam ut prædictæ Irides à compressione humoris crystallini oriantur; cum hic (lentâ utpote substantiâ præditus) difficulter admodum figuram

44 *De Membr. five Tunic.*

ram propriam resumat,
item utrinque per hu-
morem aqueum & vi-
treum à tali corruga-
tione impediatur.

Inspit.

fig. 8.

Tunica cornea perenni
humore à vasis lymphaticis scaturiente allui-
tur, qui inter eam &
cilia, licet exiguâ copiâ
fluit. Hinc est quod
dum Oculis penè oc-
clusis corpora lucida
intuemur, radii, instar
trabium luminosarum,
ab iisdem videntur pro-
fluere. Humor enim il-
le interfluit (uti ami-
cus doctiss. D. *Nevvton*
supponit) versus ciliorum
fim-

fimbrias parum assurgit (sicut aqua in vase altius intumescit dum à vasis marginibus terminatur) quo pacto contingit quosdam radios ab hoc humore refringi, priusquam attingant tunicam corneam, indeque tam sursum in confinio superioris cili, quam deorsum in confinio inferioris, detorqueri.

Tunicæ sclerodi sub-5. *Uvea.*
jicitur *χοροειδής*, cujus pars anterior propriè uvea denominatur. Hæc *Vid. fig.* membrana à fundo O-3. culi ad pupillam usque pro-

46 De Membr sive Tunic.

protenditur; illic verò duplicata ex unâ parte iridem, ex aliâ processus ciliares efformat. Nigra est, ut radios (ab Oculi fundo ad anteriorem ejus partem reflexos) obumbret; nè hi (ut ait clariss. *Cartesius*) ad Oculi fundum retorti ibidem confusam visionem efficerent. Alia forsàn ratio hujus nigredinis statuatur, quod radii in visione superflui, qui ab objectis lateralibus proveniunt hoc ritu absorbeantur. Ita enim è loco obscuro interdum objecta optime intuemur; quia radii

Lib. de
Hom.

radii tunc temporis circumfuso lumine non diluuntur ; atque hinc secundum Perspectivæ regulas tubulum Oculo admovemus , nè radii laterales distinctam objecti visionem interturbent.

Hic verò tunicæ uveæ usus apud homines præcipue obtinere videtur, quoniam inter plerisque quadrupedes (qui noctu præsertim victum quæritant , aut tenellæ suæ proli tunc temporis invigilant) hæc membrana cæruleo vel flavo colore refulget , adeoque

48 De Membr. sive Tunic.

que ab exiguâ lucis vibratione fatis illustratur ; unde ex parte forsan contingit, quod hi noctu meliùs quàm homines vident, ut (vice versa) nos interdiu eisdem visùs acumine proculdubio superamus.

6. *Iris.* Ex hâc tunicâ, ut modò dictum est, producitur Iris (è triplici circulo composita) quæ nunc cærulea, nunc cæsia, nunc nigra evadit: imò verò aliquando in eodem viro (uti novi) Oculorum Irides diversi coloris existunt; quod proculdubio à diversâ caloris & spi-

& spirituum (è cerebri lobis prodeuntium) temperie & distributione dependet. Quam opinionem ulterius stabilire videtur observatio illa *Aristotelis*, Cap. 10. Ratio lib. 1. de Hist. Animal. *generalis* proposita; ubi ait *μόνον* *diversi* ὁ μάλιστα ἢ μάλλον τὸ ζώον *coloris* *I-* ἄνθρωπος, πολὺς τε τὰ ὅμοια *tidum* ματὰ ἔστι τὸ δὲ ἄλλων, ἐν εἰ-
 δῶ. Homines enim magis indole, temperie, & vitæ ratione differunt, quàm cætera animalia, quæ uno ferè & simplici victu perfruuntur. Hinc qui præfervidæ sunt indolis Iridem (ab adestâ nimis & torridâ
 C san-

50 De Membr. five Tunic.

sanguinis parte huc copiosius adveſtâ) nigram obtinent; uti in iis, qui intra Tropicos degunt, præſertim appareat: cùm interim *Germani, Angli, &c.* Boreales terræ partes incolentes (in quibus ſc. hæc pars uveæ à debiliori calore minus excoquitur) Oculis ut plurimum cæſiſis potiantur.

7. Ratio Hæc ratio diverſi coloris Iridum in genere particularis. ſtatuatur; arduum verò eſt, cauſam afferre, cur in individuis quibuſdam (& præſertim inter homines) hæc potius

De Membr. five Tunic. §1

tius tunicae uveae pars
in formam tam concin-
nam & variegatam assur-
git. Pulcherrima sane
haec quaestio à nemine
hactenus (ob recondi-
tam Colorum naturam)
fatis discussa conjectu-
rae locum & veniam
concedit. Supponen-
dum itaque est tunicam
uveam (quae, ut supe-
rius dictum est, ab in-
teriori nervi optici cor-
tice producitur) ver-
sus partes suas extre-
mas (five Iridem) in fi-
lamenta tenuissima, di-
versimodè hinc illic (uti
in illo ferè serici confe-
cti genere, quod No-

52 De Membr. sive Tunic.

Sirates ad morem Italorum *Tabby* appellant) extantia; transire; quæ materiam lucidam, à diversâ reflexione, in tales colores *undatim* disponunt: (an verò secundum clariss. *Cartesii* vel ingeniosiss. D. *Nevvtoni* hypothesein, præter instituti nostri rationem est hîc loci disquirere.

8. Quod interim hæc dispositio colorifica à subtilissimâ filamentorum Iridis texturâ dependet, per analogiam cum aliis phœnomenis factam compareat. Hæc enim ratione sericum album

De Membr. sive Tunic. 53

album, per microscopium, conspectum, varios colores prodit; dum linteum ejusdem coloris vel papyrus albissima (utpote è compage crassiori composita) eosdem dilucide non reflectunt: Eodem ritu avium plumæ (versus subtiles earum extremitates) & purissima plantarum germina seu flosculi colores aliquando pulcherrimos repræsentant. Hoc modo etiam videtur, quòd in aquæ bullâ inflatâ colores (instar Iridis) versus summitatem magis conspicui apparent; cò-

C 3 quod

54 De Membr. sive Tunic.

quod ejusdem pars suprema tenuior sit (utpote primò ab aëre disrupta) cùm interim partes crassiores versùs fundum subsidant.

9. *Ligamentum ciliare.* Pars altera tunicae uveæ, è fibris motricibus pectinatim dispositis constans, dicitur *ligamentum ciliare*; quod humori crySTALLINO incumbens eum (pro re natâ) dilatat vel constringit adeò ut motum branchiarum, in piscibus reciprocum quantenus æmuletur.

10. *Phylla.* E circulari tunicae uveæ,

De Membr. five Tunic. § §

uveæ, hoc ritu duplicata, limbo pupillâ efformatur; quæ contrahitur aut dilatatur (pro ut usus exigit) ut in febribus, & nobis ad nivem aspicientibus, manifestum est.

Reciproco sanè huic motui pupillæ stellarum scintillatio quodammodò deberi potest; quatenus hinc radii stellæ laterales (qui à limbo exteriori, tanquàm totidem puncta lucida sub angulo insensibili proveniunt) nunc longiores, nunc breviores apparent, & tremulo more vibrari observantur.

C 4. Mo-

56 De Membr. five Tunic.

II. *Ejusdem Motus.* Motus hic pupillæ spiritibus animalibus fibras ligamenti ciliaris replentibus ut plurimum debetur; ita ut hisce versùs humorem crystallinum contractis, Pupilla dilatatur; iisdem verò protensis, vicissim contrahitur. Hinc forsandùm oculos sursum attollimus (quatenùs eâ ratione nervus opticus contra propensionem suam naturalem torquetur, & debitus inde spirituum, ad has fibras contrahendas, affluxus impeditur) pupilla ritè dilatari nequit; adeò ut tunc temporis

poris radios pauciores
admittat.

Et hæc mihi videtur 121
ratio, cur astra appa-
rent majora prope hori-
zontem quàm in locis
meridianis: quod non
contingit (uti vulgò di-
citur) à radiorum refra-
ctione per vapores jux-
ta superficiem terræ
dispositos; (cùm, ut ab
hodiernis Astronomis
observatur, angulus,
qui astri magnitudinem
per instrumenta sua me-
titur, semper idem sit,
five stella in loco meri-
diano, vel prope hori-
zontem existat) quin

C 5 po-

58 De Membr. five Tunic.

potius ex eo pendet, quod spirituum influxus ad pupillam ritè dilatandam & radios quosdam stellæ laterales admittendos necessarius à prædictâ Oculi positione inhibetur. Eâdem forsan de causâ illi qui in templi fastigio, vel situ altiori, positi sunt, minores apparent aliis in loco inferiori confidentibus, quàm hi illis; uti ab insigniss. *Verulamio* nostro (Experiment. 5. Cent. 3. Nat. Hist.) observatur.

13. *Tunica retiformis.* Tunica tertia dicitur *retiformis* è fibris medullaribus.

laribus composita, inter
quas & cerebrum maxi-
mum commercium ex-
erceri supponimus, (qui-
bus nempe profundius
læsis, Symptomata in-
terdum lethalia cerebro
inferuntur;) adeò ut Re-
tina primarium visionis
organon meritò statua-
tur. Nec enim humor
crystallinus, quem radii
plurimum refracti per-
transeunt; nec tunica
choroëides (secundùm
alios) huic usui ullate-
nùs inservire possunt.
Hæc enim pars (utpote
è piâ meninge exorta)
nequit cerebri meditul-
lio, quod neutiquam
C 6 attin-

60 De Membr. *ſive* Tunic.

attingit, radiorum impreſſiones communicare: quod interim munus à fibris retinæ medullaribus optimè peragitur.

Objectiones interim quæ huic ſententiæ repugnant, facilè diluantur. Primò enim ajunt, quòd retina radios debito more non ſiſtit, dum (uti compertum eſt) colores tunicæ choroëideos transmittit. Secundò, Quòd mucoſa & lenta ejusdem ſubſtantia, ad vividas lucis impreſſiones recipiendas, vel aliò deferendas, apta

apta esse non videtur.
Ad prius argumentum
verò respondeo, quòd
licet hi colores per fi-
brarum interstitia tranf-
luceant, ipsas tamen fi-
bras non adeò permeant
(præsertim versùs nervi
Optici exitum, ubi
densius agglomerantur)
quàm hæ (ferè instar
chartæ oleo tinctæ &
partim diaphanæ, in
laterna lusoria) ad fr-
stendas species suffi-
ciant. Objectio secun-
da, facile refellitur ex
eo quòd tunica retifor-
mis ejusdem substantiæ
cum cerebro existat;
quod tamen ad omnes

C7 obje-

62 *De Membr. five Tunic.*

objectorum impressio-
nes tam retinendas
quàm aliò deferendas
idoneum esse reperitur.
Supponimus itaq, quod
radii lucidi in tenella,
seu mucosa hujus tuni-
culæ filamenta altius
penetrantes spiritus a-
nimalis contentos inti-
mè afficiunt, & cum iis-
dem veluti commiscen-
tur. Omnis verò dubi-
tandi ansa tollitur per
vulgare illud experi-
mentum in Oculo bovi-
no recens extractio in-
stitutum; ubi sola reti-
na (exectà nempe eâ
parte sclerodis, quæ
pupillæ regioni obver-
fatur)

De Membr. five Tunic. 63

fatur) objectorum ima-
gines in fundo Oculi
depictas repræsentat.

Hæ fibræ tunicæ reti- 14. *Ejus-*
cularis à fundo Oculi *dem fi-*
ad ligamentum usque *bra in*
ciliare protenduntur, *papillam*
ut spiritus eidem ad mo- *commi-*
tum suum continuan- *grantes.*
dum impertiant; quas
comitantur (eundem
forſan in finem) plurimæ
arteriolæ valdè conſpi-
cux, ſi Soli exponan- *vid. fig.*
tur. Et ſicut radii con- 7.
refracti à diverſis parti-
bus proſecti tandem in
apicem coëunt; ita præ-
dictæ fibræ ad nervi Op-
tici exitum papillam
quan-

64. De Membr. five Tunic.

quandam (per literam
F. in fig. 2. designatam)
efformant.

15. Juxta hanc papillam
visio objecti perfectissi-
ma forsan oriatur, qua-
tenus radiorum impres-
siones indè immediate
ad cerebrum propagan-
tur: Nec enim ratio-
nes à Clariss. *Mariotto*
allatæ me in senten-
tiam contrariam defle-
ctant. Primò enim cer-
tissimum est, quòd in
omnibus Oculis huma-
nis (quos saltem mihi
dissecare contigit) ner-
vus Opticus pupillæ è
diametro opponitur,
adeò

Inspic.
fig. 5.

adeò ut radii, in visione objecti directâ, in hanc partem necessario incidant. Secundo quod experimentum à doctiss. illo viro *Parisis* institutum contrarium non evincit. Supponamus enim secundum *D. Picardum* (qui hoc experimentum ulterius illustravit) chartæ albiſſimæ particulam (per literam A in fig. 4. denotatam) muro affigi, ad cujus latus dextrum & sinistrum duæ aliæ chartulæ B, C, duos circiter pedes à priori distantes, apponantur. Quo facto, si quis è regione chartæ

Inspic. Ephemer. E-rud. gall. p. 198.

66 *De Membr. sive Tunic.*

chartæ A ad distantiā 9
vel 10 pedum consistat,
& collocatam inter ut-
rumque Oculum (cir-
ca D.) digiti extrema-
tem intueatur, char-
tam A evanescere ad-
vertet. Quod ut mihi
videtur ex eo contingit,
quod neutri axes Optici
eidem obversentur, dum
digiti extremas D. in-
spicitur: Oculus enim
dexter F chartulæ B di-
rectè opponitur, uti e-
tiam sinister E chartulæ
C. obversatur; hinc e-
nim hæ duæ usque ap-
parent, licet eodem
tempore charta A eva-
nescat.

Hoc

Hoc interim statuen- 16.
dum est, quòd licet fi-
bræ tunicæ retiformis
(circa prædictam papil-
lam) in unum quasi fa-
sciculum colligantur,
ubivis tamen, uti in
nervo Optico, distin-
ctæ manent; (uti in
retinâ bovinâ aquæ te-
pidæ, in vase vitreo
contentæ, impositâ &
leviter agitâtâ manife-
stum est; quæ inde Soli
obversa tenuissima Sin-
donis filamenta elegan-
tissimè refert) adeò ut
diversis objecti punctis
totidem distinctæ fibræ
respondeant, quæ in-
de partium situm exa-
ctè

68 *De Membr. sive Tunica.*

Etè repræsentant. Sic enim objecti alicujus ab Oculis remotionem percipimus, licet idem semper in lineâ rectâ à nobis recedat, quoniam hâc ratione axes Optici minûs perpetuò ad se invicem inclinant, indèque Oculorum figura & positio mutantur; quò fit, ut radii à prædicto objecto provenientes nova retinæ filamenta successive feriant, quæ in diversis admodùm Cerebri partibus terminantur.

C A P.



CAP. IV.

De Humoribus.

Perspectis Oculi tunicis
proximè ad ejusdem
penetralia, perspicuas
sc. illas lucis transen-
nas, sive humores pro-
peremus. 1.

Illi verò sunt tres quan-
titate & consistentia (pro
variâ radiorum refra-
ctione ab Opticis ube-
riùs explicatâ) discre-
pantes, Humor enim
cry- 2. Hu-
morum
numerus
& disse-
rentia.

crystallinûs, quoad pondus, aqueum bis excedit, qui interim à vitreo, plusquàm duodecies superatur; uti porrò quoad gradus densitatis crystallinus humorem vitreum ter, aqueum verò decies videtur superare. Causa verò tam diversæ densitatis à nemine hætenûs (quod novi) assignatur; probabile tamen est humorem aqueum à sanguine, reliquos verò à superfluo nervi Optici humore nutritio derivari. Hi enim, cochlearis ope, prunis aut lucernæ diutius impositi *gelatinam* quandam

dam exhibent; ubi interim humor aqueus penitus evaporat.

Supponimus itaque ^{Ratio} quod in foetu humor ^{diversæ} crystallinus primò sub ^{eorum} formâ *guttulæ rosida* è ^{densita-} Nervo Optico in oculi ^{tis:} cavitatem (pariter ac *Ovum* è cæco tubæ Fallopiæ ductu in uterum) delabitur; quæ à cambio nervi lentè distillantiaucta in formam humoris crystallini faceffit: Postea verò succus nervi nutritius (fætu ferè perfectè formato) uberiori copiâ forsan ad oculi fundum devol-

devolvitur, & in vitrei
humoris nutrimentum
cedit.

3. *Humor aqueus*, five
anterior, maximè pu-
illæ motui & radiorum
temperationi infervit :
Hinc ex humoris hujus
defectu in senibus (&
adultis præfervidi tem-
peramenti) visionis mu-
nus non ritè peragitur.
Una enim debita refra-
ctio eo modo deficit,
quam conspiciendorum u-
sus solet compensare.
Quùm verò hic humor
ex accidenti reparatur
(ut in defluxionibus a-
liquandò contingat)
hinc,

hinc , imminutis hifce humorum defluviis , fenes illi priftino interdum vifûs acumine redonentur. Novi enim feptuagenarium, qui, cùm per decennium ferè conſpicilla uſurpaſſet, tandem (dum ab incautâ ad fenestram lectione, tempore hyemali, frigus ſuſcepit) tali humorum defluxione correptus eſt, ut objecta ad diſtantiam 3 pedum dignoſcere nequiret. Huic itaque malo veſicatorii & collyrii applicatione, atque aliis medicamentis internè aſſumptis occurrens, defluxionis materiam mi-

D nuit,

nuit , & densa humorum
nubila ex parte discuffit ;
adeo ut jam per 6 annos,
conspicillis fepofitis, vel
minimos in libro chara-
cteres legat : cujus caufa
proculdubiò augmento
cuidam hujus humoris
tribuenda eft.

4. In hoc humore ali-
quando fuffufiones, ut in
morbo icterico , & ca-
taractæ (à craffis & vifci-
dis humoribus hîc loci
aggeftis) contingunt ; &
aliquando cæcitas incu-
rabilis ab incauto Cinguli
Mercurialis ufu & faliva-
tione imperfectâ ; quò
fit , ut nimia feri collu-
vies

vies ad hanc partem devolvatur.

Humor intermedius, five crySTALLINUS, ligamento ciliari cinctus in vitrei humoris sinu blandè recumbit; ità verò ut in centro Oculi non sit exactè sita, quin ad pupillam propiùs vergit, quo plures radios obliquè incidentes excipiat. Ejusdem pars antica in homine & quadrupedibus segmentum majoris ellipseos refert, dum interim postica minoris segmentum æmulatur; quò fiat, ut radii permeantes eatenùs collecti mo-

*S. Cry-
stalli-
nus.*

*Inspic.
fig. 5.*

re debito in retinam commigrent. in piscibus verò hujus humoris figura globosior est, ut radios eò magis refringeret, qui humorem aqueum, seu medium ejusdem densitatis transeuntes debitam aliter refractionem non subirent.

Fundam.
optic.
lib. 3.
part. 2.
cap.
13.

A pressione hujus humoris (ut opinatur *Scheinerus*) lux illa in tenebris elicitur ; licet explicatu arduum sit quo modo hic humor circumfluis humoribus munitus comprimeretur, vel adeò pressus figuram pristinam

nam (utpote è glutinosâ substantiâ compositus) recuperaret. Quinetiam observatu dignum est, quòd pressio illa versus Oculi fundum, sive ultra humoris crySTALLINI regionem, fieri debet; quo meliùs prædicta lucula appareat: unde nec

Clariss. *Kepleri* sententia assentiri possum, qui asserit spiritus animales hoc ritu ex Iridis filamentis attritis eodem modo elici, quo per frictionem è felium dorsis hirsutis excutiuntur; cùm interim lux aliquandò nullâ pressione adhibitâ (à strenuâ sc. narium in

*Paralipom.
in Vitell.
cap. 5.*

tenebris emunctiōe) ex Oculis eliciatur. Probabile itaque est phænomenon prædictum à contorsione fibrarum tunicæ retiformis potissimum oriri; unde spiritus animales à novâ hâc & vividâ vibratione, sicuti à lucis radiis, afficiuntur. Eâdem forsan ratione fœlium Oculi in tenebris à magnâ spirituum quantitate & motu rapidiori lucent; & in viris quibusdam, ad iram immodicè propensis, hæc spirituum animalium vibratio sæpius observatur. Sic enim *Cæsar* (lib. I. de bell. Gallic.) ait *Gallos*

‘los dixisse sese, sæpenu-
‘merò cum militibus
‘Germanis congressos,
‘nè aciem quidem Ocu-
‘lorum ferre potuisse. A
spirituum nempè, in cer-
tamine præliari, excan-
descentiâ Oculi hoc ritu
scintillarunt, & infig-
nem futuræ victoriæ fa-
cem prætulere.

Humoris crySTALLINI 6. Fi-
figura variat in diversis gura.
hominibus, adeò ut se-
nes hunc humorem ni-
mis depressum & immi-
nutum habeant; unde
radii non satis refringun-
tur: Myopes verò vitio
contrario laborant, qua-

D 4 tenùs

tenùs humorem crystal-
linum nimis globosum
obtinent , & forsan
(quoad consistentiam)
densiorem seu compa-
ctiorem ; qui inde diffi-
cultèr admodum attenu-
nuatur aut absimitur ,
adeò ut hi ipsa senili æta-
tate conspiciillis haud in-
digeant.

7. *Vi-
treus.*

Tertius, seu postre-
mus , Oculi humor *vi-
treus* nuncupatur ; qui
cæteros insigni modò su-
perat : àdeo ut Oculi
fundum repleat & mem-
branas egregiè distendat.
Hic humor , ut modò di-
ctum est , ab uberi succi
ner-



nervosi copiâ (præfer-
tîm in adultis) enutri-
tur, indéque semel amif-
sus ab externis remediis
(quicquid è contra fingit
Kerckringius in *Speci-*
leg. Anatom. p. 198.)
nunquam reparetur.

Humor verò aqueus, *Con-*
utpote è sanguine proge- *ful.*
nitus, faciliùs forsan *Schott.*
(tunicæ corneæ vulnere *prælus.*
detergentium & adstrin- *Opt.*
gentium ope priùs ob- *Artic.*
ducto) processu tempo- *7. &*
ris instauretur, si modò *Raii*
vera sint, quæ de *Catal.*
ulmi *plant.*
& *chelidonii* viribus apud *Can-*
Authores prædicantur. *tab.*
pag.
179.

D 5

A re-

8. *Hu-* A refractione radio-
morum rum, hos tres humores
usus. transeuntium, visionis
munus potissimum de-
pendet; quod eò melius
peragitur quando hi pu-
rissimi & summè diapha-
ni existunt: cùm verò à
copioso nimis particula-
rum heterogenearum af-
fluxu inquinantur (ut ab
ebrietate & vini ardentio-
ris potu contingat) ne-
cesse est, ut Oculorum
acies obtundatur.



CAP. V.

*De Arteriis, Venis, &
Nervis, item de motu
spirituum animalium.*

Oculus multiplici va- I. O-
forum serie instrui- culi
tur, quæ nutritioni, mo- vasa.
tui, & sensui inserviunt:
Hæc verò sunt arteriæ,
venæ, nervi optici, mo-
torii, & pathetici.

Arteriæ, quæ nutri- 2. Ar-
mentum partibus suppe- teria.
D. 6 ditant,

ditant, à Carotidum utrinque ramis oriuntur; qui ad Oculum deflexi propagines ejusdem musculis, adipi, & membranis (in felibus & viverris satis conspicuas) imperiunt. His respondent

Venæ. totidem venæ, tam externæ quàm internæ, à

Vid. fig. 7. magnis jugularium ramis prodeuntes; quarum hæ minutissimos furculos retinæ impendunt, illæ nervi Optici fibrillas (tunicæ sclerodi insertas) comitatæ, propagines innumeras Oculi albo immitunt: unde forsan in Epilepticis (hoc nervo in spasmus acto

&

& variè contorto) hæ
venæ , à sanguinis cir-
cuitu impedito , disten-
tæ , summam aliquando
rubedinem Oculis in-
ducunt.

Nervi Optici juxta 3. Ner-
corpora striata egressi , vi Op-
indèque in transitu uniti, ^{tici.}
ab invicem statim disce-
dunt ; & tunicæ sclerodi
fibrillas plurimas elar-
giuntur. Insignis sunt
magnitudinis & fibris
quamplurimis à tertio
nervorum pari (ut ait
Clarifs. *Willisius*) do- ^{Lib. de}
nantur ; quò magis per ^{Cer. A-}
vices ampliari possint, ^{nat. c,}
& uberior spirituum pe- ^{21.}

nus Ocula in visione sub-
ministratur.

4.
Vid.
fig. 2. Constant ex duabus
tunicis (quæ ab utrisque
Cerebri meningibus pro-
deunt) & medullâ seu
fibris; quæ ordinatâ se-
rie ad Oculi fundum &
sclerodem deferuntur.
Fatemur interim fibras
hasce medullares, circa
nervorum unionem, vi-
sum effugere: easdem
utcunque distincto ordi-
ne à cerebro deferri sup-
ponimus; uti in porcis
appareat, & ex observa-
tione Clariss. *Vesalii*
(cap. 4. lib. 4. de Corp.
Human. Fabric.) mani-
festum.

festum est. Ille enim ait
 ' *se in muliere Patavii*
 ' *dissectâ (cui dexter O-*
 ' *culus ab infantiâ emar-*
 ' *cuerat, sinistro interim*
 ' *integerrimo) invenisse*
 ' *dextrum nervum toto*
 ' *progressu, ab exortu*
 ' *ejus in cerebro, sinistro*
 ' *longe tenuiorem.* Hæ
 sunt spirituum & succi
 nutritii semitæ; quibus
 ex parte interceptis, pun-
 cta nigricantia, secundum
 Insigniff. * *Willisium* no-
 strum, in Oculis oriun-
 tur: si verò penitus ob-
 struantur, gutta serena,
 seu totalis luminis eclips-
 is infertur.

* Lib.
 de Ce-
 reb, A-
 natom.
 cap.
 21.

Nervi

5. Mo-
torii.

Nervi motorii propè infundibulum (illam ἐγ-κεφάλῃ sentinam) oriuntur; unde forsan in phlegmaticis & viris hebetioris indolis, quorum cerebra majorem aquei humoris copiam hìc loci congerunt, Oculorum vibrationes parùm celeres aut vividæ observantur; eò quod hi nervi nimia feri colluvie onusti, ad motum ineptiores evadunt. Quum verò hi nervi à fero acri hìc loci aggesto irritantur, Oculi Spasmis levioribus obnoxii appareant. Juvenis sane ingenuus, hujus Academiæ alumnus, per
feme-

femestre ferè spatium
(ut à Viro curioso & artis pictoriæ perito accipi) Oculo convulsivo per vices laborans tandem sub Autumni novissimi finem vomitu & levi vertigine correptus est. Exhibito itaque priùs vomitorio, & julapio Cephalico propinato, sanguis è venarum jugularium ramis, hirudinum suctu ; detractus est. A quibus remediis per 3 aut 5 dies æger prædictis symptomatis immunis perstitit ; & magna quidem curationis spes amicis affulsit. Postea verò sine causâ eviden-

evidenti recidivam passus, julapia sudorifica, cephalica, &c. assumpsit; quæ tamen nè hilum profuere, adeò ut morbus hic nullis herbis medicabilis evaserit; quin miserimus Juvenis delirio, item narium & labiorum spasms per triduum exercitus, tandèm convulsivus interiit Aperto itaque cranio, circa *glandula pituitaria* sedem, & nervorum omnium (præterquam olfactorum) exortum, item in ventriculis magnam feri subfalsi, & prasino colore tincti, copiam reperii; quæ spasmos proculdu-

culdubiò prædictos induxit. Quatenùs verò acris hæc materia primò *guttatim* tantùm vel exiguâ copiâ infundibulum petransiit; hinc nervos obitèr motorios & appensos musculos in spasmos leviores, per vices, forsan incitavit.

Hi nervi per Oculorum musculos (attollentem sc. deprimentem, adducentem, & obliquum inferiorem) disseminantur; & in bove (uti observavit Clariss. *Willisius*) reliquis duobus ramulos impendunt. Observatu enim dignum est,

6.
Lib. de Cereb. Anat. cap. 21.

est, quòd ab uno nervo totidem diversi motus in Oculo peraguntur (ut 4. digiti ab eodem musculo perforante commoven-
 tur) quatenùs ejusdem chordæ, seu fibræ, è cranio egressæ totidem distinctis partibus prospiciunt. Supponendum interim est totum nervi corpus, & prædictas fibras, perenni spirituosæ materiæ influxu irrigari; unde appensi muscoli, per se, æquali virtute pollent: cùm verò animæ imperio; vel quâcunque de causâ, exigua hujus succi spirituosi quantitas in unam potius
 quam

*Ratio
 motûs
 muscu-
 laris in
 oculis.*

quàm aliam fibram propellitur, statim illa (vicinas fibras premens, & earum penum ex parte præpediens) appensum musculum ad se trahit, & antagonistam suum superat; quemadmodum vel minimum pondus bilanci, in æquilibrio positæ, superadditum eidem motum statim impertibit. Sicut enim aliquandò in sternutatione ad Solis aspectum; è levissimo *materiæ subtilioris* accessu motus à nervis initur, quatenus hinc particulæ quædam acres narium cavernis inclusæ rarescunt, & paris quin-
ti

ti fibrillas , quasi aculeis ;
exagitant : ità forsan ubi
vel minima spirituum co-
pia (ceui liquor ab embo-
lo syringæ) in fibras mus-
culi propellitur , iisdem-
ve levissimè inspergitur ,
statim hæ ad motum con-
citantur. Supponimus
enim quòd licèt spiritus
animales versus primos
eorum fontes (præfer-
tìm in corpore sano) exi-
guâ vel nullâ forsan *accre-*
dine præditi sint , à cre-
brâ verò in angustis ner-
vorum fistulis agitatione
paululùm exacuantur ? in-
déque in fibras muscula-
res per vices impulsì eas-
dem statim contrahant ,
&

& spiritus illic hospitan-
tes ad motus suos pera-
gendos instigent ? nec
sanè aliâ ratione viscera,
ad munia sua ritè obeun-
da, extimulent, vel ex-
crementitii humoris ex-
pulsionem moliantur.

Quæ interim opinio 7.
placido huic Oculorum
motui magis congruere
videtur, quàm violenta
spirituum explosio, vel
fermentatio illa à nervei
& sanguinei liquoris
mixtione orta : qui duo
modi corporis motui (in
statu sano constituti)
proculdubiò adverfan-
tur.

Nervus

8. Nervus patheticus musculo trochleari inferitur; quem in passionibus amoris & pudicitiae, ad angulum Oculi internum torquet, adeoque *languentem* (uti dicimus) *aspectum* inducit.

9. Motus spirituum animalium in oculos. Motus spirituum animalium in musculos & nervum Opticum blandus & æquabilis efficit, ut res distinctè à nobis apprehendantur: ubi verò (ut in ebriis & maniacis) inæquali motu & defultorio cientur, statim confusa admodum rerum phantasmata in nobis

nobis producuntur. Ab eâdem causâ dependet alteratio illa à *primo Nicotianæ haustu*, & *navigazione*; quatenus spiritus in motum inusitatum & præruptum concitantur, adeoque musculos in varias partes contorquent, & radios ab objectis provenientes, modo instabili, nunc in hæc, nunc in illa retinæ filamenta vibrant.

Quòd verò prædicti 10.
effectus spirituum animalium motui potissimum debentur, ab experimento vulgari innotescat. A corpore enim cir-
E cum-

cumgyrato (five oculi interea aperti sint, five sint clausi) omnia objecta circa nos posita, reclusis statim palpebris, videntur in orbem moveri, eodémque more circumacta aliquandiu apparent, etiamsi hæc corporis agitatio non ulterius continetur: eò quòd spiritus animales (utpote corpora fluida) hoc motu correpti instar aquæ se habent, quæ in vase circum rotata plures exinde, licet vas quiescat, circuitus absolvat. Supponimus enim in hac corporis circumgyratione spiritus animales tam cere-

cerebrum quàm cerebellum incolentes motu eodem tornatili affici ; adeò ut à directo, in medullam spinalem & nervos appendicatos crurales, *influxu* detorqueantur : unde hi debitâ suâ & consuetâ penû (ab interruptâ spirituum serie seu filo) destituti corporis molem sustinere non valeant, quò minùs in terram prolabantur. Postea verò ubi spiritus ordines priores & series resumunt vertigo penitùs cessat, & functio motiva denuò exercetur.

A totâ ferè animâ II. 9.

E 2 cor-

corporeâ , seu spirituum animalium congerie, hoc ritu affectâ *distinctum a-liquod Principium* nobis inesse appareat; quod diviniore auræ particeps in imaginationem nostram imperium exercet.

Undè alitèr fit , quòd vel ipsi pueri hanc corporis circumgyrationem inter ludicra ponunt ; & dum scenam hanc versatilem intuentur, irrident eodem momento delusam imaginationem , & conscii sunt , vel in illâ ætate , principii alicujus , quod imaginationis errores (eo ipso tempore

pore quo *omnimodè* afficitur) more debito redarguit.

Sicut verò motus , ità ^{12.} *Quan-*
etiam debita spirituum *titas.*
animalium quantitas (quâ
tunicæ Oculi ritè tensæ ,
& visioni accommodæ
conserventur) proculdu-
biò requiritur ad Objecti
sensationem meliùs pro-
ducendam. Hinc quorum
Oculi magnâ spirituum
animalium penu replen-
tur , optimè vident: quo-
rum defectu senes versùs
crepusculum (propter
flaccidam tunicarum in-
dolem) malè objecta di-
stinguunt ; dum interim

Juvenes eadem sat benè dignoscunt , quatenùs eorum Oculi perenni spirituum animalium copiâ inflentur. Propter eandem rationem *feles* & *equi* Oculorum membranas optimè distentas obtinent; ut vel minimas lucis impressiones persentiscant. Calida enim hæc animantia magnâ spirituum quantitate donantur ; ut à flammulis, (quæ aliquandò in horum jubis à sudoribus nocturnis, & in illorum dorsis, à frictione, apparent) manifestum est. Virum sanè calidæ indolis novi in comitatu *Bedfordiensi* de-

gen-

gentem, qui Oculis hisce
 felineis (quales etiam
Tiberius Caesar habuisse *Plin.*
 dicitur) donatus est; *Nat.*
 adeò ut epistolam ab in- *hist.*
 timo amico conscriptam *lib. II.*
 mirè admodum in loco *cap.*
 obscuro (ubi eadem mihi *37.*
 vix apparuit) perlegit.
 Hujus verò Oculi (nisi
 quòd pupillas insignio-
 res obtinuerent) ab alio-
 rum formatione neuti-
 quàm discrepabant: Sup-
 ponimus verò eorundem
 membranas tenellas ad-
 modum & feniles exti-
 tisse; quas porrò ingens
Φωτεινὴ & *ἑσπέρια* seu spi-
 rituum animalium copia
 proculdubiò irradiavit,

ut præter morem solitum vel minimâ lucis impressione afficerentur.

13. *Pro-
portio
inter
Spiri-
tuum
& ra-
diorum
mo-
tum.* Præter motum debi-
tum, & prædictam spi-
rituum animalium quan-
tita-tem, certa quædam
proportio, seu *analogia*
inter spirituum & radio-
rum, ab objecto pro-
fluentium, motum (ad
perfectam visionem)
proculdubiò requiritur.
Dum enim radiorum vi-
brationes spirituum ani-
malium motui præpol-
lent, visionis munus non
ritè exercetur. Hinc fanè
è loco obscuro egressi lu-
cis radios ægrè intuemur,
quate-

quatenùs spiritus anima-
les tardiùs & remissiùs in
tenebris agitati , radio-
rum impetum statim su-
stinere nequeunt ; donec
• recollectis viribus , *more*
quodam *elastico* , resili-
unt , & à prædictis for-
san radiis in motum ra-
pidiorem concitantur.
Quantum sanè *materia*
ætherea spiritus anima-
les afficit , ex *avibus*
Numidicis, *Leonibus*, &
Tauris constet ; quos co-
lores *rubri* summe inter-
dùm efferant ; eò quòd
hinc lucis radii motu ra-
pidiore retorti spiritus
animales præter morem
solitum exagitant. Co-

E 5 lores

lores interim *virides* aut *cærulei*, qui materiam lucidam modicè reflectunt, visum reficere & spiritus animales quâsi demulcere videntur; quoniam hinc inter utrosque debitum quoddam *æquilibrium servatur*; Quod verò ab aspectu ad nivem & alia corpora *alba* destruitur, quatenùs hinc nimia radiorum copia ab infinitis eorundem superficieculis ad oculos reflectuntur. Eâdem ferè ratione contingit, quòd foco propiùs assidentes in somnum proclives evadimus; quatenùs spiritus animales à præpotenti particularum

larum ignearum impetu
profligati , in cerebri me-
ditullium exindè adigun-
tur.

Hæc omnia ab impro-
portionato radiorum lu-
cidorum motu contin-
gunt : interdum verò ex
parte spirituum anima-
lium (dum sc. hi supra
modum agitantur) visio-
nis actio impeditur. Ità
fanè locum umbratilem
ingressi objecta nequa-
quàm cernimus , usque-
dum motus spirituum
animalium gradus ali-
quot velocitatis suæ a-
mittat , & radiorum im-
pulsui aliquatenùs cedat.



E 6

Idem

14.

Idem ferè contingit ab aspectu ad Solem, quum radiorum lucidorum actio adeò spiritus animales exercet, ut statim impressiones objectorum debiliores eosdem ægrè afficiant.

Quinetiam à prædictæ analogiæ defectu nec astrorum nec umbræ gnomonis motus nobis compareant; neque ex alia parte glandis è bombardâ explosæ, aut titionis accensæ & circumactæ, motum satis assequamur.



CAP. VI.

*De Glandulis , & vasis
lymphaticis.*

Delineatâ jam par-
tium Oculi ichno-
graphiâ , superest ut,
paucula de ejusdem ap-
pendicibus , glandulis sc.
& vasis lymphaticis ,
adjiciamus. Quæ licet,
propriè loquendo , sint
tantùm partes Oculo
conterminæ ; dum verò
insignem usum eidem

E 7 præ-

præstant hæc emunctoria, & concinnâ admodum structurâ efformantur, hîc loci³ examinationem particularem exposcunt.

2. In utrâque parte Oculi laterali recumbit glandula; una in angulo interno fita, ab Anatomicis lachrymalis improprie dicta, cùm (quod Clariss. *Whartonus* de utrisque supponit, rectius verò huic competit) nè vicesimam lachrymarum partem supeditet. Ex hac verò 2. vel 3. vasa, in palpebræ partem interiorem designen-

nentia , lympham recipiunt ; quæ indè in duos meatus , seu puncta lachrymalia , & canaliculum à Clariss. *Stenone* innarium offerepertum devolvitur : Unde in fletu humor aliquando è naso extillat , & à pulvere oculis illapso per nasi emunctionem interdùm liberamur.

Alia glandula (à quibusdam innominata , lachrymalis verò propriè dicta) in angulo externo reconditur ; quæ conglomerata est, sive è pluribus lobis componitur , qui exiles vaforum lymphati-

3. *Ex-
terna
seu la-
chry-
malis.*

*Inspic-
fig.8.*

phati-

phaticorum propagines
tunicæ adnatæ submini-
strant.

4. Ea-
rum
vasa.

5. Ar-
teria.

Modus
sepa-
ratio-
nis
lym-
pha.

Vasa hisce glandulis
adrepentia sunt primò ,
Arteriæ à Carotidum ra-
mulis ortæ , quæ uberem
satîs lymphæ quantita-
tem hîc loci deponunt ;
præfertim ubi sanguis (ut
in fœminis & infantibus)
fero copiosiori abundat ,
& glandulæ prædictæ
compagem laxiorem ob-
tinent. Probabile est in-
terim arterias hasce pro-
pagines *minores* & ferè
directas glandulis im-
pertire ; per quas lym-
pha (utpote majori mo-
tu

tu & fluiditate pollens)
è sanguinis sinu elapsa re-
ctà fertur: *maiores* verò
& aliquatenùs *retortos*
furculos in venas emit-
tere, per quos sanguis
redux divertitur.

Aliter sanè non con-
jecturare licet (siquidem
sententia clariss. *Steno-*
nis de directione nervo- *Lib. de*
rum, elcito, ut ait, men- *musc.*
tis imperio subjectà, in- *&*
certa sit) quo ritu lym- *gland.*
pha separetur, vel non *p. 48.*
æquè ac sanguis per ve-
nas reducatur. Nullum
enim *fermentum lixivi-*
ale (quale renibus inesse
alii supponunt) hîc loci
reperi-

reperitur ; nec quidem lachrymarum falsedo ab aliis causis , quàm à diuturnâ illa lymphæ (quâ acefcit) in glandulis morâ , & spirituum forsan effœtorum reliquiis illuc depositis deducenda est.

5. Vasa reliqua sunt 2.
 2. *Ve-* Venæ à jugularibus dela-
ua. tæ ; quæ sanguinem (à fero more prædicto fe-
 paratum) reducant. 3.
 3. *Ner-* Nervi à quinto nervo-
vi. rum pari oriundi , qui
Cap. non secundum Insignis.
 26. *lib. de Whartonum* lachryma-
gland. rum fontem augent ; quin potius glandularum , & vasorum appensorum , irrita-

irritationi inservire videntur: quo meliùs contenti humores foris expellantur. Spiritus enim animales per hos nervos delati nec motui nec sensui inserviunt; usum verò aliquem proculdubiò præstant: has nempe partes sæpiùs impellendo, verberando, & irritando expulsionem humoris excrementitii (quam alii *facultati expultrici* malè attribuunt) perpetuò moliuntur.

Horum usus.

In passionibus itaque gaudii repentini, vel mæstitiæ (uti Clariss. *Willisius* noster ostendit) perpetuò moliuntur.

6.
Lib. de Cereb. Anat. cap. 22.

hic nervus, propter communionem illam cum nervo intercostali, spasmus affectus glandulas premit, & contentam lympham amolitur.

Dum enim nervus quinti paris ex unâ parte præcordiis prospicit, ex aliâ verò hisce glandulis, item naribus, palato, & maxillæ superiori ramulos impertit: hinc unâ ejusdem propagine affectâ seu corrugatâ, alia statim in consensum trahitur. Hinc sanè à titillatione narium & sternutatione, item à sinapeos vel potius præfervidi aut
acrio-

acrioris assumptione, à risu denique & oscitatione, lachrymas emittimus; quatenus una nervi prædicti fibra, eo ritu contracta, alias vicinas in eundem spasmus necessariò corripit.

Vasa octo lymphatica 7. *Va-*
à glandulâ posteriori or-*sau-*
ta in tunicam adnatam *lym-*
desinunt, ibidemque ex-*phati-*
iguam lymphæ copiam *ca.*
perpetuò deponunt? ut *Inspic.*
in cæcis quibusdam ob-*fig. 8.*
servetur: adeò ut si glandula prædicta ab acri quovis humore erodatur, Epiphora, sive stillicidium perenne, inducitur,

citur, quod à *decocto Guaiaci, Chinæ, &c.* (præmissis universalibus) interdum (uti novi) imminuitur; (quatenus hinc serum superfluum per transpirationem aliò amandatur, indèque fons prædictus exarefcit,) sed rarò admodum perfectam curationem admittit.

8. *Lachrymarum fontes.*

Horum vasorum oscula anteriori tunicæ adnatæ regioni prospiciunt; quæ inde, cùm à *corticis aurantii pressis, cepæ incisæ*, aut aliorum corporum (quæ sale volatili abundant) effluviis irri-
tantur,

tantur, lympham suam
 statim exonerant & la-
 chrymas effundunt. Hu- *Lym-*
 jus verò lymphæ usus *phæ*
 major est, quàm ut la- *usus*
 chrymarum fontem so- *prima-*
 lummodò enutriret: Pro- *rius.*
 babile enim est peren-
 nem hujus humoris sca-
 turiginem (ut superius
 Cap. 3. memoratum est)
 Oculos & cilia alluere,
 & ad eorundem motum
 & nitorem maximè con-
 ferre. Membrana enim
 cornea hoc humore, no-
 ctu præsertim; perfusa
 magis nitida & polita
 evadit; adeò ut (instar
 vitri convexi) radios lu-
 cis reflectat: sicuti ex
 icun-

icunculâ illâ , ab ejusdem superficie reflexâ, liquet; quæ humori crystallino neutiquâm debetur , cùm etiam supra Iridis regionem appareat. Quum verò prædictus humor deficit , aut absumitur ; ut ex Ophthalmiâ , lectionibus nocturnis & diuturno ad ignem confessu, item à rebus calidis (vino sc. absinthite , &c.) internè assumptis contingat : hinc tunica cornea more debito non turgescit , quin benigno hoc humore destituta in rugas dolorificas sæpiùs contrahitur.

Hic

Hic est proculdubiò
primarius vasorum lym-^{9. Usus}
phaticorum usus; quæ ^{secun-}
interim secundariò deci-^{darius.}
denti lachrymarum pro-
fluvio, & pathematis
nostris exhibendis infer-
vire statuuntur.

CAP. VII.

*De variâ Oculi forma-
tione in diversis Ani-
malibus.*

Varietas illa, quæ in
Oculorum structurâ ^{1. Va-}
(inter corpora hæc sub-^{ria O-}
cœlestia) observatur pul-^{cali}
chra quidè est & insi-^{forma-}
tio.

F. gnis;

gnis ; cùm interim *superna lumina* unicâ tantum & simplici formâ perfruantur. Infinitum verò opus esset sigillatim omnes horum differentias percensere ; instituti tamen nostri ratio postulat , ut eorum saltèm *historiolam*, ab aliis prætermisam , exordiremur. Enim verò hæc differentia non tantum inter diversa animalia, quin & inter individua ejusdem speciei aliquandò existit.

2. In
homi- Inter homines procul-
nibus. dubiò licet Oculi (quoad
affectiones generales)
similes sint, tamen quo-
ad

ad peculiarem suam fabricam, vultuum instar, discrepant. Nec enim tunicae corneae convexitas, nec humorum refringentium indoles, neque retinae ad impressiones recipiendas aptitudo, nec nervi Optici tonus, nec denique spirituum animalium motus & indoles (qui forsan, *spirituum Chymicorum* instar, quoad qualitates & operationes suas variant) in omnibus ad amussim conveniunt.

Propter hanc Oculorum & spirituum animalium *idiosyncrasiam* 3.
F 2 diversè

diversè aliquando de
formâ ejusdem fœminæ
judicatur, adeoque ho-
mines singuli, uti vide-
mus, *modo peculiari* my-
sticam amoris vim & ma-
gneticos illectus persen-
tiunt.

4. In
cæteris
ani-
mali-
bus.

Quod ad cætera spe-
ctat animalia, observatu
dignum est eorum Ocu-
los diversimodè admo-
dum efformari; adeò ut
notam quandam propri-
am, seu *criterion specifi-*
cum exhibere videantur.

5.
Quoad
tunica
corneæ
tempe-
riem.

Primò enim quoad tu-
nicæ corneæ indolem di-
versi gradus *tenuitatis &*
teneri-

teneritudinis occurrunt, quorum minimus forsàn in *Aquilâ* reperitur, licet hæc volucris (pariter ac Noctua) *cartilagine niſtitante* gaudet, (uti Clariff. *Gassendus* Cap. 7, lib. 7. Tom. 3. observavit) quam per vices radiis solaribus opponit. Quamvis fanè hæc membrana in plurimis animalibus valdè tenella & sensilis, utpote *tendinea*, existit; (undè à corrosivis *fumi* aut salinis *saponis*, aquæ admixti, particulis irritata statim in rugas dolorificas contrahitur, & ab ictu levissimo diu plerunque tor-

quetur) in *Noctua* verò ,
vespertilione , *Nyctico-*
race , &c. proculdubiò
 majorem in modum à
 vehementi radiorum vi-
 bratione afficitur ; indè-
 que hæc animantia diur-
 nam lucem ægrè patiun-
 tur, (quemadmodum vi-
 ri *tenellæ constitutionis*
 aëris vices statim perfen-
 tiscunt) cùm interim mi-
 tiores Lunæ radios facilè
 sustineant.

6. Pupilla in *homine*, ca-
Quoad ne, firmio (licet felis pu-
pupilla pupilla in loco obscuro di-
figu- latata, aut post mortem
ram. relaxata & cultro Ana-
 tomico subiecta , circu-
 laris

laris apparet,) & multis quadrupedibus, item in piscibus & volucribus circularis est: in bove autem, caprâ, equo, ove, & quibusdam aliis elliptica; ut eò magis in hisce forsân animalibus, quæ prono incessu victum in agris quæritant, radios laterales ad mala & incommoda utrinque devitanda admittat. Ità enim eorum muscoli pinguedine infarciuntur, ut Oculos statim in varias partes (ad morem aliorum animantium) torquere nequeant.

7.
Quoad
Iridis
colo-
riùs rem.

Color *Iridis* (ut supe-

F 4

riùs rem.

rius Cap. 3. memoratum est) maximè differt: In *homine* enim, *cane*, *fele*, *noctua* majori, & aliis quibusdam volucris; item in *piscibus* & *serpentibus* concinnus admodum apparet: in cæteris verò rudi tantum more depingitur; cujus differentiæ ratio à *diversâ* filamentorum tunicæ *tenuitate* proculdubiò desumenda est.

8. Musculi in *homine* exigua tantum pinguedine obvoluti sunt, & minores quàm in *vitulis*, *ovibus*, &c. (forfan propter diversum cerebri calorem)

rem) existunt; qui por-
rò in brutis hisce à *prono*
gressu, & copiosiori ma-
teriæ affluxu magis enu-
triuntur.

Humores in *homine*, ^{9.}
fele, & *cane* summè dia- *Quoad*
phani apparent: *humor* *humo-*
verò *crystallinus* admo- *res.*
dum exiguus est, habito
respectu ad *vitulos*, *oves*,
& cætera animantia; quæ
pupillâ ellipticâ donan-
tur. Supponimus itaque
quòd hic humor in omni-
bus proportionem ad *pup-*
illam perpetuò servat.

Fundus Oculi, sive ^{10.}
tunica choroeides, in
F 5 pluri-

Quoad plurimis quadrupedibus
colo- (propter causas forsan,
rem cap. 3. traditas) *diversi-*
tunica color apparet; in *homine*
choro- interim & *porco*, item in
eideos. *avibus* & *piscibus*, ple-
 risque nigra conspicitur:
 in *Raiâ* vero hæc pars co-
 lorem *argenteum cæru-*
leo mixtum (concharum
 instar Orientalium) ele-
 gantè repræsentat.

II. Nervi Optici in *Raiâ*
Quoad *pisce*, modo peculiari à
nervo- cerebri basi orti, & po-
rum steà *trochleâ* quâdam
opti- communiti separatim ad
corum Oculos deferuntur; in
unio- *homine* verò & *quadr-*
nem. *pedibus* arctissimè (in *pi-*
scibus

scibus tamèn per *simpli-*
cem solummodò *contra-*
ctum) uniuntur: indèque
in *nobis* (ut superiùs,
Cap. 3. dictum est) item
in *cane, fele,* (& in cæte-
ris forsan *calidis* anima-
libus) ad fundum Oculi
delati pupillæ regioni *Inser-*
prospiciunt; dum inte- *tio-*
rì in aliis *quadrupedi-* *nem.*
bus, uti etiàm in *pisci-* *Con-*
bus & *volucris* obli- *spic.*
què semper tunicæ scle- *fig. 1.*
rodi inferuntur. Unde *& 5.*
conjectare proclive est,
in *nobis* & *prædictis ani-*
malibus sphæram visio-
nis præ aliis, ampliorem,
& ejusdem actionem
perfectiorem existere.

Ità enim à supremo rerum Architecto optimè provisum est, ut Creaturæ *agiles* & summâ *perspicaciâ* præditæ hoc ritu *præstantiori visu* perfruantur.

CAP. VIII.

De administratione culturi Anatomici in dissectione Oculi.

1. **P**erlustratâ demùm Oculi compage & variâ structurâ, superest ut filo Anatomico tyrones in amœnum hunc làbyrinthum, & intimiores ejusdem

jusdem recessus perdu-
camus.

Primò verò antequàm 2. Ex-
 Oculi anatome institua- perim.
 tur, ejusdem fabrica ex- de mo-
 ternâ & humorum con- do vi-
 tentorum, ad visionem sionis.
 peragendam, indoles
 observentur. Si enim
 Oculis bovis recens in-
 terempti foramini, in
 velamentis cubiculi clau-
 sis factò, vel tubuli ex-
 tremitati adaptetur, ima-
 gines rerum extrâ posi-
 tarum in fundo Oculi ap-
 parebunt (ut ostendit
 Clariss. *Cartesius*) mo- Cap. 5.
 dò, exactâ parte illâ tu- Diop-
 nicæ scleroticæ, quæ tric.

pupillæ è diametro opponitur , ovi putamen in locum partis abscissæ substituas. Hæc verò omnia meliùs apparebunt, si Oculum *canis vetuli* , seu potiùs *Noctuæ* , luci exponas : in fundo enim hoc ritu objecta conspiciuntur inversa, & dextrorsum mota videntur transire in partes sinistras; item colores varii pulcherrimo spectaculo per scleroticam apparent. Quod experimentum luculentius ut mihi videtur, quam illud *Cartesii* , modum visionis explicat ; cum partes hoc more in situ natura,

naturali & integræ con-
spiciantur.

Oculi fabrica *externa* 3. Mo-
& visionis modo ritè *di 4. in*
perspectis, statim ad e- *Oculi*
jusdem Anatomen acce- *diffe-*
das, quæ quatuor hisce *ctione.*
modis potissimum pera-
gatur.

Primò vel more *Car-* 4. Mo-
tesiano secundum axem, *dus*
tempore brumali, fece- *pri-*
tur; cum Oculus sum- *mus.*
mogelu constrictus hu- *Cap. 3.*
mores suos in situ natu- *Diop-*
rali exhibeat: hoc modo *tric.*
verò aliæ partes rudi tan- *Vid.*
tum more apparent. Vel *fig. 5.*
secundò, Oculus aquæ *Secun-*
feryen- *dus.*

ferventi aliquantispèr immergatur, ut ejusdem tunicæ eò melius ab invicem separentur: hinc verò partes nimium corrugatæ naturalem earum figuram & nitorem perdunt.

Sequuntur duo alii modi, qui difficultatem aliquando & molestiam tyronibus afferunt; qui vero intentioni Anatomicæ optimè inserviunt.

5. *Tertius.*

Aperitur enim tertio, Oculus ad partem *anticam*; ubi palpebræ circa ciliorum margines priùs inciduntur, tunicâ interim

rīm adnatā intactā , nè
vasa aliter *lymphatica* vi-
olentur. Dein cultellus
orbitæ propiùs admove-
atur , & periosteum cau-
tè ab *osse arcuato* separe-
tur ; nè musculi obliqui
superioris *trochlea* ulla-
tenùs lædatur : quod sæ-
piùs contingit , nisi pe-
riosteum prædictum pe-
nitùs auferatur.

Inspic.
fig. 1.

Hiscè ad fundum us-
que Oculi peractis , *ner-
vus Opticus* apparebit ;
qui hamulo retractus ,
scalpello inde excisorio
locum concedet. Ocu-
li hoc ritu exempti va-
sa *lymphatica* inprimis
conspi-

Vid.
fig. 8.

conspicienda sunt; quæ in tunicam adnatam sub tot *papillarum* formam (in Oculo *vitulino* recens extracto optimè conspicuarum) desinunt. Hæ omnes fetas porcinas admittunt, quarum ope prædictorum vasorum origines in glandulis investigentur. Quibus perspectis tunica adnata penitus excindatur, ut musculorum tendines in conspectum veniant; indeque muscoli, modo statim describendo; separentur.

Hisce postea cum pinguedine sublatis tota tunica

nicæ scleroticæ superfici-
 es convexa apparebit,
 ejusdémque pars ante-
 rior, seu *cornea* sectio-
 ne circulari, forficulæ
 ope, abscissa, *aqueum*
humorem, (qui repentè
 diffluit.) item *pupillam*,
 & *iridem* ostendet. Ca-
 vendum interim est, nè
 dum *humor aqueus* exi-
 lit, & tunica hæc flac-
 cescit, *iris* à forficis cus-
 pide (ut aliquando in de-
 pressionè *cataractæ* ab
 acu argenteâ) dilacere-
 tur. Eâdem porrò caute-
 lâ ad tunicæ uveæ à scle-
 rode separationem, item
 ad humoris crySTALLINI &
 processuum ciliarium fi-
 tum

tum inspiciendum opus est: quod more sequenti melius peragatur.

6. *Quartus.* Ad partem itaque *posticam* Oculus quartò optimè aperitur, si (patientia adhibitâ) cranii ossa ferrulâ vel cuneo divisa, vossellæ ope, minutatim extrahantur: ut eò nervi *optici*, *motorii*, *pathetici*, item rami quinti & sexti paris *Ophthalmici*, unâ cum musculis appensis, denudentur, & distincta eorum commercia in propatulo exhibeantur. Dein hisce nervis juxta origines suas rescissis, eorum insertiones

ones sedulò observentur; quarum interventu rami quinti paris (ut superius dictum est) *glandulis & palpebris* , propagines sexti paris *musculis abducentibus & suspensoriis* , pathetici *trochlearibus* , nervi denique *motorii* reliquis prospiciunt: Nervi interim Optici ad partes Oculorum posticas utrinque deferuntur. Hisce perlustratis & pinguedine cautè sublatâ musculi proximè evolvendi sunt ; in quorum separatione à *trochleari* semper exordiendum est, indèque cæteros præsertim si *nervus Opticus* priùs

prius mensæ affigatur) à
 parte posteriori ad ante-
 riorem five tendines
Inspic. progressus, cultelli ope
fig. 1. facilè secernas.

7. A muscutorum exa-
 mine ad membranas de-
 veniendum est, quarum
 extima seu *sclerodes* sta-
 tim cernitur; cujus late-
 ri vulnus levissimè infli-
 ctum primò *choroeidem*
 subjacentem, indèque
 mucosam *retinæ* substan-
 tiam prodibit. Postea,
 forficulâ in labia vulneris
 immissâ, pars Oculi po-
 sterior, versùs fundum,
 ab anteriori abscindatur;
 quo pacto ex unâ parte
humor vitreus, crystalli-
nus,


nus . & *processus cilia-*
res, jucundo sanè spe-
 ctàculo, in situ suo ap-
 parebunt; & *tunica re-*
tiformis ex aliâ parte,
 item *uvea*, & *sclerodes* *Cult.*
Anat.
lib. 3.
c. 8.
 (quicquid in contrarium
 statuit Lyserus) ab invi-
 cem facile separantur.

In encheiresi verò hâc 8.
 Anatomicâ summa dili-
 gentiâ & cautelâ opus
 est, nè partes prædictæ
 nimiâ præcipitantiâ vio-
 lentur. Rarò itaque to-
 ta succedit operatio, nisi
 tyro Anatomicus partes
 antea corporis majores
 crassiori saltèm more dis-
 secuerit : subtilis enim
 & tenella hujus organi
 textu-


textura summam Anatomici diligentiam & artem exercebit.

2. Hi sunt præcipui modi administrationis Anatomicæ; aliis verò, per intervalla, viis & methodis insistendum est; eò quod omnia organi hujus pulcherrimi ornamenta nequeant unâ vice collustrari. Quamobrem repetitâ sæpius indagine opus est, ut debitum partium omnium situm, figuram, & connexionem perpendat Anatomicus; quò indies perfectiorẽ earũ notitiã assecutus, immensã Conditoris nostri sapientiam impensius admiretur.

FINIS.









EXPLICATIO

Fig. primæ.

In quâ Nervus Opticus & Musculi in Oculo Ovino describuntur.

- a. Musculus attollens.
 - d. Deprimens seu antagonista, cum nervi Motorii ramulo h appenso.
 - c. Adducens juxta cartilagineum seu musculum nictitatem n desinens.
 - b. Musculus abducens versus musculum suspensorium in paululum deflexus.
 - g. Nervus Opticus obliquè tunica scleroti insertus.
 - e. Musculus obliquus superior trochlea l insertus, & subter tendinem musculi attollentis desinens.
 - †. Periosteiporuiuncula trochlea prædictæ adharens. quæ aliis pro musculo habetur; licet hæc pars potius ejusdem
- G
- nexui

nexui quam motui inservire videatur.

f. *Musculus obliquus inferior cum parte Orbitæ appensâ, in quâ foramen peculiare obtinet.*

in. *Musculi suspensorii portio à nervo Optico g separata, & sursum versus abducentis tendinem deflexa.*

o. *Pars tunica adnata.*

p. *Nervi motorii ramulus in plures propages juxta musculi deprimentis principium divisus.*

q, q, q, &c. *Musculorum tendines.*

Fig. Secunda.

Oculi tunicas obliquè sectas ostendit, ut Nervus Opticus in conspectum veniat.

a, a. *Pars tunica sclerotica posterior.*

b, b. *Choroëides eidem subjecta.*

c. *Tunica retiformis paululum retracta.*

d, d, d. *Ejusdem fibra tanquàm tota-*
dii

EXPLICATIO. 147

*dii ad centrum Nervi Optici f propo-
tantes.*

*e, e, e, e, e. Arteriarum & venarum
exiles propagines ad ligamentum cilia-
re tendentes.*

*g. Tunica Nervi Optici exterior retra-
cta, ut interior appareat.*

Explicatio Fig. Tertiæ.

*a, a, a. Pars tunica uvea, qua scleroticâ
adhesit.*

*b. Iris, seu prædicta tunica duplicata
pars exterior.*

*c, c. Ligamenti ciliaris portio evoluta,
qua prius parti tunica uvea e, e. ad-
hesit.*

t. Pupilla humori crystallino incumbens.

Explicatio Fig. Quartæ.

a. Chartula intermedia.

b, c. Duæ Chartæ laterales.

*d. Locus digiti spithamæ circiter distan-
tiam à nasi extremitate g amoti.*

f. *Oculus dexter. e. sinister.*

1, 1, 2, 2, 3, 3. *Ec.* *Filamenta Nervorum Opticorum homologa seu concordia, ad similes sc. rum Oculorum rum thalamorum Opticorum regiones spectantia ; quæ horum protuberantiis (ceut tot chordarum unisonarum paria ponticulis suis) protendi supponuntur.*

Figura Quinta.

Oculum secundum axem sectum representat, ut diversæ humorum regiones compareant.

b, a, b. *Tunica cornea, seu arcus oculi convexior.*

e, e. *Tunica uvea (cujus foramen o dicitur pupilla) humori aqueo c, c, c, c. innatans.*

d. *Humor crystallinus in situ ; qui quoad partem anticam segmentum majoris ellipsis, quoad posticam vero minoris segmentum refert.*

f, f. *Tunica chorooides, quæ in hac figura (utpote à scletoricâ in in nimis separata)*

EXPLICATIO. 129

parata) nequit more debito repraesentari.

- g. Nervi Optici portio pupilla regioni in homine prospiciens, cum ejusdem fibrillis in oculo bovino satis conspicuis.
- h. Fibrilla aliquot juxta nervi exitum abscissa.
- 1. Humoris vitrei & Retina centrum.
- 2, 3, 4, 5, &c. Nervi Optici capilamenta, quorum extremitates utrinque abscissa ligamento ciliari (juxta humoris nempe crystallini regionem) adherebant.

Figura Sexta.

Partem Nervi Optici transverse secti & exiccati, ejusdemque fibras in Oculo bovino conspicuas repraesentat.

Explicatio Fig. Septimæ.

- a. Humor crystallinus.
- b, b, b. Pars humoris Vitrei, cui reti-

150. EXPLICATIO.

na portio incumbit.

c, c, c. Venula & arteriola plurima ligamento ciliari ⁊ protensa, quæ vitro vel crystallo imposita, indeque Soli observæ optime apparent; quas Retina fibrilla e e comitantur.

Figura Octava.

Exhibet glandulam externam seu lachrymalem & vasa octo lymphatica in oculo vitulino optimè conspicua.

a, b, c. Tunica adnata seu albuginea retracta.

d, e, f. Tunica cornea regio,

g. Glandula externa seu lachrymalis.

h. Pinguedinis portio, quæ glandula prædicta accrescit.

i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seta porcina immisse in vasorum lymphaticorum oscula i, i, i, l, l, i, i, i, quorum duo intermedia l, l, una cum ramulis n n in glandulam desinentibus in propatulo exhibentur.

CAPIT-

CAPITUM ET RERUM SYNOPSIS.

C A P. I.

De Oculo in genere.

O culi praestantia	Pag. 17
Partes Oculi propriae & adscit- tiae	19
Cur ejusdem pars antica postica convexior est	20
Situs Oculorum commodus, quod debi- tam distantiam servant, & quod in aequilibrio positi sunt	21
Unde est quod unica tantum sensatio ab ambobus exoritur	22
Ratio apparentiae objecti geminata à pres- sione Oculi, ubi opinio vulgaris re- fellitur	23
Cur strabonum Oculi hoc vitio non labo- rant	24
Oculi magnitudo respectu objectorum visi- bilium expenditur	25

C A P. II.

De Oculi partibus, & speciatim de
Musculis

- M**usculorum numerus in homine 28
 Cur Musculus attollens deprimente major est. ibid.
- Duo musculi obliqui seu amatorii. 30
- Duo reliqui in brutis, quorum unus suspensorius dictus usum insignem (præter opinionem vulgarem) videtur obtinere 32
- Quinam nervi motui horum musculorum inserviunt ibid.
- Unde à morbis, studiis immodicis, &c. musculi flaccescunt 34
- Causa mora spirituum animalium in contractione musculi; ubi Cartesii sententia de valvulis circa principia musculorum rejicitur. ibid.
- Usus musculorum secundarius, quo tam sensui quàm motui inserviunt 35

C A P. III.

De Membranis sive Tunicis.

Membranarum numerus statuitur
contra opinionem Merfenni pag.

39

Quid dicendum est de tunica cornea sub-
stantiâ

ibid.

Tunica adnata vasa in Ophthalmiâ con-
spicua

40

Tres tunica cornea lamella, qua in ocu-
lo bovino facile separantur

41

Causa iridum, qua circa lucernas inter-
dum apparent

ibid.

Cur hæ compressioni humoris crystallini
neutiquàm tribuenda sunt

43

Humor tunicam corneam perpetim allu-
ens

44

De trabibus luminosis, qua à corporibus
lucidis videntur profluere, dum eadem
clausis ferè oculis intuemur

ibid.

Tunica choroeides iridem & ligamentum
ciliare progit

45

G 5

CHR

Cur nigra est in homine, in aliis verò
animalibus diversicolor 46

Cur Iris præsertim in hominibus tam va-
riis coloribus depingitur 47

Unde est quod Germani, Angli, &c.
Boreales terræ partes incolentes ocu-
lis castis, Zona verò torrida inco-
la nigris ut plurimum donantur.

Ratio particularis coloris variegati Iri-
dis ibid. 49. 50

A subtilissimâ filamentorum indole (per
analogiam eam aliis phænomenis fa-
ctam) deducitur 52

Usus ligamenti ciliaris, & Motus re-
ciprocus 54

Pupilla motus 55

Unde est quod stella scintillare viden-
tur ibid.

Pupilla obsequitur motui fibrarum liga-
menti ciliaris; quibus contractis dila-
tatur, & vice versâ 56

Unde est, quod dum oculos attollimus,
pupilla nequit ritè dilatari, indeque ra-
dios pauciores admittit ibid.

Cur

Cur astra apparent majora propè hori-
zontem quàm in locis meridianis.

57

Unde contingat (secundùm observatio-
nem insignis. Verulamii nostri) quod
in templi fastigio positi minores appa-
reant aliis in loco inferiori confidenti-
bus, quàm hi illis

58

Tunica retiformis (utpote cerebro affinis)
statuitur esse primarium visionis or-
ganon

59

Sementiæ de humore crystallina, &
tunicâ choroeide expenduntur, &
adversariorum argumenta diluun-
tur

60

Juxta ejusdem fibras in papillam com-
migrantes perfectissima visio ori-
tur

64

Mariotti rationes in contrarium alla-
ta examinantur

ibid.

Unde est quod charta intermedia in ex-
perimento à D. Picardo proposito eva-
nescit

65

Quomodo distinctæ fibrarum Retinæ series
optimè conspiciantur

67

G 6

Unde

Unde est quòd objecti ab oculis remotio percipitur, licet idem semper secundum lineam rectam à nobis recedat 68

C A P. IV.

De Humoribus.

Humorū numerus & differentia pag. 69

Ratio diversa eorum densitatis 71

Humoris aquei usus 72

Observatio particularis de visu instaurato in sene 73

In humore predicto fiunt suffusiones & cataractæ; item cecitas interdum incurabilis à cinguli Mercurialis usu & salivatione imperfecta 74

Humoris crystallini situs 75

Scheineri & Kepleri sententia de luculæ apparentiâ in tenebris à pressione oculi expenduntur 76. 77

Vera ejusdem phænomeni causa assignatur 78

Humo-

	157
<i>Humoris prædicti diversa figura</i>	79
<i>Cur Myopes ætate senili conspiciunt non indigent</i>	80
<i>Humoris vitrei quantitas</i>	ibid.
<i>Cur hic humor semel amissus neutiquam reparatur contra assertionem Kerkringii</i>	81
<i>Unde verò est quod humor aqueus è tunica cornea vulnere exiliens forsitan instaretur</i>	ibid.
<i>Quare ebrietas, & vini ardentioris usus immodicus visus acumen obtundunt</i>	82

C A P. V.

*De Arteriis, Venis, & Nervis;
item de motu spirituum animalium.*

<i>Arteriarum exortus & propagines</i>	Pag. 83
<i>Vena tam interna quam externa</i>	84
<i>Unde est quod in paroxysmo interdum Epileptico Oculi rubescunt</i>	ibid.
<i>G 7</i>	<i>Ner-</i>

Nervorum Opticorum progressus & tunica 86

Eorundem fibrae circa unionem ne utrumquam confunduntur, quin distincto ordine deferuntur à Cerebro, ut ex observatione Vesalii elucescat ibid.

Unde nascuntur puncta nigricantia & gutta serena 87

Nervorum Motoriorum exortus 88

Unde est quod hebetes & phlegmatici Oculos parùm vivide vibrant ibid.

Instantia insignis de Oculo convulsi-vo ibid.

Quibus musculis nervi motorii prospiciunt 91

Ratio motus muscularis in oculis 92

Unde aspectus languidus in amafis 96

Motus spirituum animalium in oculis ibid.

Unde à primo Nocotiana haustu, & navigatione vertigo inducitur 97

Quare etiam à corpore circumagyrato objecta videntur moveri motu circulari 98

Unde

Unde est, quod ad terram concidimus

Pag. 99

Argumentum, quo probetur principium
aliquod distinctum nobis inesse, quod
materia exors est 100

Requiritur debita spirituum quantitas ad
tunicas rite inflandas 101

Cur senes versus crepusculum malè obje-
cta distinguunt ibid.

Unde est quod feles & equi tunc temporis
sat benè vident 102

Observatio particularis de viro quodam
calida indolis, qui epistolam ab inti-
mo amico conscriptam in loco obscuro
perlegit ibid.

Proportio inter spirituum & radiorum lu-
cidorum motum 104

Cur è loco obscuro egressi lucis radios agrè
intuemur ibid.

Quare colores rubri aves Numidicas, tau-
ros, & leones exasperant 105

Unde est quod colores virides & carulei
oculis adblandiuntur 106

Cur nix & corpora alba oculorum aciem
prastringunt ibid.

Vnde

Unde est quod foco propius assidentes
in somnum proclives evadimus
pag. 106.

Cur è loco lucido in obscurum transeun-
tes objecta agere cernimus 107

Cur idem contingit ab aspectu ad So-
lem 108.

Quare nec astrorum, nec umbra gno-
monis, neque glandis è bombardâ
explosa, nec titioni accensa & cir-
cumvoluta motus nobis distinctè com-
pareant ibid.

C A P. VI.

De Glandulis & vasis lymphaticis.

Glandula interna improprie lachry-
malis dicitur pag. 110.

Unde à fletu humor è naso extillat
III.

Quomodo à pulvere oculis illapso per na-
si emunctionem liberamur ibid.

Glandula externa proprie lachrymalis
nunc.

nuncupatur	161
Arteria glandulis prospicientes	ibid.
Vnde fœmina & infantes in fletum pro-	p. 112
clives	ibid.
Modus separationis lymphæ	ibid.
Unde lachryma sunt salsa	113
Glandularum vena	ibid.
Earum Nervi, quorum usus assignatur	
contra sententiam clariss. Whartoni.	114
Cur à gaudio repentino & mœstitiâ la-	
chryma exiliunt	115
Vnde etiam est quod à titillatione nari-	
um, sternutatione, sinapeos vel potius	
præservidi aut acrioris assumptione,	
item à risu & oscitatione lachrymas	
emittimus	116
Vasa & lymphatica à glandulâ externâ	
oriunda	117
Epiphora causa & difficilis curatio	ibid.
Cur à corticis aurantii pressu & cepa in-	
cisa effluviis lachrymas effundimus	118
Lymphæ usus primarius	119
Vnde est quod icuncula in oculo appa-	
ret	

ret

pag. 120

Cur Ophthalmia, lectiones nocturnæ, vinum absinthites, &c. visoriam facultatem debilitant

ibid.

Vsus lymphæ secundarius

121.

C A P. VII.

De variâ Oculi formatione in diversis animalibus.

Varia Oculi formatio in hominibus

pag. 122

Vnde est quod diversimodè de formâ ejusdem sæminæ sapius judicatur

124

Differentia in cæteris animalibus

ibid.

Quoad tunica corneæ temperiem

ibid.

Vnde est quod Aquila solis radios sustineat

125

Cur à fumo aut sapone aqua admixto Oculi infestantur

ibid.

Vnde est quod Noctua, vespertilio, Nyctitorax. &c. lucem diurnam agere patiuntur

126

Pupilla in homine, fele, cane, circularis est;

est; in bove autem, caprâ, equo, &c.

elliptica, & quâ ratione pag. 127

Color diversus Iridum ibid.

Musculi in homine exigui habito respectu ad vitulos, oves, & cætera animantia 128

Vnde est quod horum oculi tantâ pinguedine donantur ibid.

Humorum diversa indoles & magnitudo 129

Variis color tunica choroeideos 130

Nervorum opticorum in Raiâ pisce exortus peculiaris ibid.

Eorum unio in piscibus per simplicem contactum 131

Eorundem insertio in homine, cane, è regione pupillæ, quæ interim in cæteris animalibus oblique fit; & quâ de causâ ibid.

C A P. VIII.

De administratione cultri Anatomici
in dissectione Oculi.

E xperimentum Cartesianum de modo visionis	pag. 133
Aliud praestantius	134
Quatuor modi dissectionis oculi	135
Modus primus	ibid.
Secundus	136
Tertius	ibid.
Quartus & optimus	140
Methodus observanda in separatione musculorum	141
Quomodo humor vitreus, crystallinus, & processus ciliares in situ ex unâ par- te; item tunica retiformis, uvea, & sclerodes ex aliâ, optime conspi- ciuntur	143
Ratio cautelæ adhibenda in prædictarum partium separatione	ibid.

F I N I S.


GUILIELMI BRIGGS,

Med. Doct. Londin.

Nova Visionis

THEORIA,

Regiæ Societati *Londin.*
proposita,





PRÆLOQUIUM

A D

LECTOREM.



Hoc Specimen Optico-Anatomicum, Actis Regiæ Societatis *Londin.* non ità pridem insertum, & nuper (hortatu doctissimi *D. Newtoni*, Matheseos in *Academ. Cantab.* Professoris dignissimi) ex Anglico Sermone in Latinum traductum, eo lubentius prælo

PRÆLOQUIUM

prælo denuo permisi, partim quia Exemplaria priora distrahuntur, & partim ut operis infecuturi rationem exteris exponam.

Oculi fabricam olim examinaui, nunc novam Visionis Ideā propono: Sequentur duo Tractatus, unus de *Usu partium Oculi*, alter de *eiusdem affectibus*, in posterum (si Deus plures annos & longiorem vitam concesserit) proferendi. *Prior* in supinum hujus sæculi Atheismum præsertim intenditur, & (ni me fallit animus) è toto systemate Cosmico vix fortiora tela quam ex hac pharetra desumenda sunt. Ità sanè invito ferè genio (& quasi scintillante inter nubila erro-

AD LECTOREM.

errorum animo) fatentur *Epicuri* hoc ævo sectatores egregii *Gassendus* & *Hobbius* noster. Prior (dum in lib. 10. *Diog. Laert. de Physiolog. Epicuri* commentatur) hæc habet; — *Quenam est rationatio tot illas partes Oculi tam decorè contextas, tam elegantè figuratas, tam appositè constitutas, tam ad Visionem necessarias, tam ad aliud inutiles, non esse propter visionem factas; sed Oculum fortè fortunâ fuisse ex illis compositum, casumque esse quòd ad visionem potius quàm ad aliam functionem reperiatur idoneus? Quasi verò vel unica tunicæ Uvæ perforatio, trajiciendis rerum imaginibus*

H bus

PRÆLOQUIUM

bus adeò necessaria, non deberet istis fieri quasi janua inducendæ admittendæque sanitati in cerebrum? O, quàm merentur capti oculis seu nati esse, seu fieri, qui muneris adeò eximii Largitorem non confitentur! Sic ille. Posterior in cap. 1. lib. de Homine (ubi Opticæ præsertim incumbit) dum de Sensibus, Nutritionis organis, &c. mentionem facit, planè asserit; quòd quicunque corporis humani partes fatis perspexerint; nec tamen easdem à mente aliquà conditas ordinatasque ad sua quasque officia viderint, ipsi profectò sine mente esse censendi sunt.

Tractatus posterior de morbis seu affectibus oculi magnam etiam

AD LECTOREM.

etiam animi intentionem & labores indefessos exposcit, quorum equidem non pigebit si modò in commodum publicum & nobilissimi hujus organi prophylaxin ullatenùs cedant. Egregia quidem argumenta, quæ Dei gloriam & salutem humani generis præ se ferunt, & subtiliori (ferè dixeram Angelicâ) plumâ digna; Cùm verò Oculi structuram sæpè sæpiùs expenderim, & opportunitates ad partem Pathologicam exornandam à Principe optimo in Nosocomio Regali mihi nuper concessæ fuerint, animus ultrà propriam sphæram expansus assuetos limites non agnoscit.

Ardua hæc molimina aliorum

PRÆLOQUIUM, &c.

rum forsan suppetias exigant ; itaque alios etiam artis salutaris Professores invito & exoro, ut manus auxiliatrices huic operi dent & *Observationes Practicas* communicent, quas gratus & palàm (uti fas est) agnoscam. Tu interim (amice Lector) valeas, & conatibus hisce nostris vel blandè adspires, vel eosdem saltem æquo animo expendas.

EPI.



EPISTOLA

D. ISAACI NEWTONI, Matheseos in Acad. Cantabrig. Professoris celeberrimi, ad Authorem conscripta.

*Isaacus Newtonus Doctori
Guilielmo Briggio.*

Vir Clarissime,

Hisce tuis Tractatibus
duas magni nominis
scientias uno opere promoves,

H 3

Ana-

EPISTOLA.

Anatomiam dico & Opticam. Organi enim (in quo utraque versatur) artificio summo constructi diligentèr perscrutaris mysteria. In hujus dissectione peritiam & dexteritatem tuam non exiguo olim mihi oblectamento fuisse recordeor. Musculis motoriiis secundùm situm suum naturalem elegantèr à te expansis, cæterisque partibus coràm expositis, sic ut singularum usus & ministeria non tam intelligere liceret quàm cernere, effecerat dudùm ut ex cultro tuo nihil non accuratum sperarem.

EPISTOLA.

rarem. Nec spem fallebat ex-
 imius ille Tractatus Anato-
 micus , quem postmodum edi-
 disti. Iam praxeos hujus
 ἀντίθετον pergis ingeniosissimā
 Theoriā instruere & exor-
 nare. Et quis Theoriis
 condendis aptior extiterit,
 quā qui phænomenis accu-
 ratè observandis navarit ope-
 ram ? Nervos opticos ex
 capillamentis variè tensis
 constare supponis , eaque ma-
 gis esse tensa quæ per iter
 longius porriguntur ; ex di-
 versâ autem tensione fieri ut
 objectorum partes singulæ non

EPISTOLA.

coincidant & confundantur inter se, sed pro situ suo naturali diversis in locis appareant; & capillamentis amborum oculorum aequali tensione factis concordibus, geminas objectorum species uniri. Sic ex tensione chordarum, quâ soni vel variantur vel concordant in Musicâ, colligere videris quid fieri debet in Opticâ. Simplex etenim est Natura, & eodem operandi tenore in immensâ effectuum varietate sibi ipsa constare solet. Quantò verò magis in sensuum cognatorum causis? Et quamvis

vis

EPISTOLA.

vis aliam etiam horum sensuum analogiam suspicari possum, ingeniosam tamen esse quam tute excogitasti, certè nemo non lubentèr fatebitur.

Nec inutilem censeo Dissertationem ultimam quàm diluis objectiones. Inde Lector attentus & plenius intelliget Hypothesin totam, & in quæstiones incidet vel tuis Meditationibus illustratas, vel novis experimentis & disquisitionibus posthàc dirimendas, id quod in usum cedit juventuti Academicæ, & provectiores ad ulteriores in Philosophiâ pro-



H 5 gressus.

EPISTOLA.

gressus manuducet. Pergas
itaque, *Vir ornatissime*, scien-
tias hasce præclaris inventis,
uti facis, excolere, doceasque
difficultates causarum natura-
lium tam facile solertiâ vinci
posse, quàm solent conatibus
vulgaribus difficultè cede-
re.

Vale.

NOVA



NOVA VISIONIS THEORIA,

*Regiæ Societati Londin.
proposita.*

Ii omnes quotcunque *Propo-*
de re *Opticâ* hætenùs *siti ra-*
scripserunt, in eo fermè *tio.*
toti sunt, ut *humores*
oculi considerent (qui
mihi solummodò pro
transennis visionis hæ-
bentur, ad imagines
transmittendas à Naturâ

H 6 com-

comparatis) potius quam eas partes à quibus visio, ut à causis positivis & efficientibus, peragitur; quales proculdubio sunt *fibræ nervorum optico- rum* à cerebro pulcherri- mâ staminum tenuissimo- rum serie procedentes & in oculum tandem inser- tæ; nam profecto quis- quis paulò attentius ex- penderit in animo suo earum, 1. *Peculiarem* quandam in cerebro *na- scendi sortem*, ut & 2. *Uniformem situm*, & 3. *Modum insertionis*, is vehementer demirabitur secum tam pauca dici de tam stupendo fibrarum appa-

apparatu, ab his qui de
visione ex professo ege-
runt.

Cùm igitur in priore *Rela-*
quodam opusculo à me *tio ad*
ante aliquot annos in lu- *Oph-*
cem edito, id unicè scri- *thal-*
benti in consilio fuit ut *mo-*
anatomicam oculi descri- *gra-*
ptionem, quam potui ac- *phiam*
curatissimam perfectissi- *præ-*
mamque exhiberem, (ne- *mis-*
glectâ prorsus parte Op- *sam.*
ticorum *Physicâ*, quæ
circa lucem & colores
versatur, ut & *Mathe-*
maticâ, quæ sibi in mo-
do visionis demonstnan-
do placet) multùm diu-
que mecum postea cogi-
tavi, de addendis, in

H 7. appen-

appendiculam & auctarium ejus qui præcesserat laboris, de ipsâ visione cogitationibus meis, deque explicando minutatim & partes oculi, quæ ad visionem peragendam faciunt, & ipsam visionis rationem atque modum.

Difficultas. Quæ quidem *θεωρία*, quamvis jucundissima, salebrofa tamen est & difficultatibus, plena quas qui in hoc argumento hætenus versati sunt, mihi nondum satis explicuisse videntur, imperitiâ rerum & imperfectâ oculi cognitione præpediti, cujus anatomica descriptio

ptio nondum erat à filiis medicorum satis inquisitè & subtiliter exculta, neque latius unquam patuit eorum institutum, quàm ut de diversâ radiorum incidentiâ in *corneam*, *humores*, & *retinam* disceptarent, prætermisâ prorsus consideratione *situs & insertionis* fibrarum optici nervi, ut & *peculiaris* earum à cerebro *originationis*: quæ duæ res mihi semper visæ sunt principem in hoc negotio locum sibi vindicare; nam fibrarum prædictarum usum in visione necessarium, imò præcipuum esse, constat
ex

ex ἀπαύγαστα sive guttâ
serenâ, & sedem sensa-
tionis alicubi extra cere-
brum frustra requiri, tam
certum est quàm quod
certissimum.

Operis
insecu-
turi
ratio.

Multò plura addi pos-
sent, quæque sunt ab
omnibus Anatomicis huc
usque prætermissa; de
aliis etiam partibus oculi
quarum adminiculo uti-
tur natura in visione per-
agenda; ut de *corneâ*,
pupillâ, *processibus ci-*
liaribus, *humoribus*, *re-*
tinâ, *fibrillis optici ner-*
vi insertis in scleroden,
ut & de *motu spirituum*
animalium; quibus ac-
cedere potest etiam *actio*
muscu-

musculorum, quæ quem
usum visioni præstet, po-
steà suo loco dicetur: ve-
rùm hæc non sunt præ-
sentis instituti, agam
nunc solummodò, quàm
fieri potest breviter car-
ptimque, de iis quæ sunt
à me superiùs memora-
ta, nempe, 1. De origi-
ne optici nervi. 2. De si-
tu fibrarum ejus. 3. De
modo insertionis earun-
dem fibrarum in oculum,
quæ si peritè & probè
explicentur, non pauca
in Opticis difficillima
problemata exinde lu-
cem fœnerari possunt,
quæ adhuc in tenebris,
inque obscuro latent.

1. Ner-

Peculi- I. Nervi optici, uti
aris fi- suprà dictum est, origi-
bra- nem sibi propriam ac pe-
rum culiarem habent; nam
Opti- cùm cæteri nervi, illic
carum. ubi incipiunt, *in plano*
Exor- constituti, origines à
tus & *flexura* fundo cerebri arcessant,
 hi cæteris altiùs initia ca-
 pessentes, oriuntur à bi-

* *Vid.* nis quibusdam * *processi-*
Fig. I. *bus convexis* (qui ab A-
III. natomicis dicuntur, *Tha-*
ad fi- *lami nervorum optico-*
nem *rum*) ità ut tensio fibra-
hujus rum quæ incipit ab illis,
tracta- neutiquam abludat à
tus. chordarum flexu, qui
 cernitur in ponticulo si-
 ve magadio panduræ,
 quam nos vocabulo fe-
 qui-

quioris ævi *Violam* ple-
rumque vel *Violinam*
vocamus, cujus formam
omnes nōrunt, utrin-
que ab humili pariter fa-
stigiata, non leviter
declivem & convexam
esse.

Ponamus igitur duas *Rei il-*
ejusmodi *Violas* vel pan- *lustra-*
duras magnitudine & æ- *tiq.*
quali tensione æqualium
chordarum per omnia si-
bi fimiles & æquales;
deinde instruantur pon-
ticulis duobus, quales
modò descripti sunt, æ-
qualibus magnitudine &
convexitate; consequens
erit ex tali apparatu, ut
quæ chordæ à *summa*
ponti-

ponticulo cernuntur proficisci, ea utrinque habeant *maximam tensionem*, cæteræ verò tanto minorem *pro ratâ proportionem* quanto plus vel minus distant à *supremâ chordâ*.

Fibrarum opticarum tensio gradualis in eodem thalamo. Similiter si à *chordis* ad *fibras* transeamus, & à *ponticulis* ad *thalamos nervorum opti-
corum*, fiet, nisi fallor. ut quæ duæ fibræ in duobus thalamis sibi mutuò respondentes, à summo utriusque culmine proficiscuntur, eæ cæteris tensione suâ tantum *pro ratâ proportionem* præstent, quantum pars thalami, unde oriun-

oriuntur, convexior est
 & fastigiatior; ità ut quæ
 in *summo* utrinque *thala-*
lamo constituuntur, ex
 fortiantur itidem *sum-*
mam tensionem; quæ sunt
 in *imo*, *minimam*; & quæ
 in locis *intermediis* * Fig.
 utrinque reperiuntur, i. dd.
 (pro ratione distantie *cum*
 vel à *summo* vertice, vel *gg.*
 ab *imâ* thalami declivita- *colla-*
 te) pariter *intermediam* *ta.*
 & *proportionalem*; ità *Fibra-*
 tamen, ut fibræ *internæ* *rum, in*
laterales minùs exten- *utro-*
 dantur, quam *laterales* *que*
externæ, propter flexu- *respon-*
 ram utique minorem, *den-*
 * quæ nudo oculo se fa- *tium,*
 tis prodit. *situs &*
tensio
similis.

Supre-

Supremas igitur thalami utriusque fibras sibi vicissim utrinque respondentes , (utpote quæ transeunt itinere quasi parallelo , alia atque alia ad alterutrum oculum , & à *summis* thalamis ad *summam* oculi sibi utrinque attributi partem)

* Vid.

Fig. 1.

a a.

* *fibras concordēs* , vel , si Græca Latinis vehementius placent, *ὁμοτῶνες* non ineptè possumus appellare, eo quod unisonas *barbitorum* vel cithararum chordas , pari utrobique situ , magnitudine , itinere ac tensione , tam probè per omnia simulent & imitentur.

Oriri

Oriri autem eas ab *Distinctus*
 invicem diversas. ex eo *certum* est, quod *thalamorum* *earum* five *molecularum* *in cerebro* partes unde oriantur, sint à se mutuò *proculdubiò* *distinctæ*, sicut *exortus*
 inspecto * Schemate clarius patebit; neque fanè I. IIII. ulla consensùs vel concordantiæ necessitas postulabat; ut eandem utraque originem possideret, quando tam bellè congruant in situ & tensione. Quod autem de *superioribus* *fibris* thalami utriusque dictum est, idem etiam de *inferioribus* intelligi volo; eas etiam *homotonas* & *concordes* esse, utpote

pote in *tensione minimâ* consentientes ; ut & de *intermediis* , quas *Hypothesis* nostra statuit , pro distantia ratione vel à *fastigio* thalami vel ab *ejus basi* , sic sibi , in *tensione majore* , *minorive* , similiter congruere & respondere ; excepto quod , fibræ internæ-laterales minorem tensionem habeant quàm externæ , cujus rei ratio superiùs est à nobis assignata.

*Earum paral-
lelismus
seu sit-
tus u-
niformis.*

Constat , ex his quæ prælibata sunt , fibras eas quæ sibi mutuò deprehenduntur quasi *parallelae* , etiam *symphonicas* quoad *officium* & *potestatem*

statem esse, ità ut duæ
supremæ, duæ *infimæ*,
 duæ *externæ*, *internæve*
laterales utriusque tha-
 lami, sic sibi responde-
 ant in situ & tensione, ut
 cùm *utræque* eodem
 tempore moveantur ab
 objecto externo, non
 exinde tamen sequatur *Unde*
duplex sensatio, non ma- *sensa-*
 gis sanè quàm ex *unisonis* ^{tio}
 in Musicâ fortè *conso-* ^{sim-}
nantibus efficitur *sonus* ^{plex in}
duplex. Parallelismus au- ^{duplici}
 tem iste fibrarum in situ, *Nervo*
Optico,
 magnitudine, ac tensio-
 ne conspirantiū, multùm
 adjumenti recipit ab ea-
 rū *positione*, quæ est à no-
 bis proximè consideran-
 da.

I

2. Nam

Fibra- 2. Nam fibræ nervo-
 rum rum opticorum fervant
 ordo ordinem seriemque per-
 serva- petuò distinctam, & ea-
 tur per rum distinctio plurimum
 con- juvatur à connexionem
 nexio- nervorum, qui & ipsi à
 nem se mutuò manifestissimè
 Ner- distincti, fibrarum sibi
 vorum. adnexarum distinctioni
 certissimum robur & fir-
 mamentum præstant,
 dum stabiliorem paralle-
 lismum seu potius *equi-*
librium efficiunt: nam
 nervos opticos vel alte-
 rum ab altero vicissim
 decussari, vel ità coales-
 cere ut intereat prorsùs
 distinctio fibrarum, (è
 quibus potissimum con-
 stant)

stant) utrumque & rationi & experientiæ repugnat; nam ii, qui in thalamis opticis * à dextrâ parte nascentes reperiuntur, pergunt itinere dextro versus dextrum oculum; qui à sinistrâ, sinistro itidem itinere ad sinistrum pergunt.

In piscibus plerisque res ipsa pro se loquitur, ubi nervi utrique juncti deprehenduntur, sed non nisi per *simplicem contactum*, ita ut in ipsâ coalitione maneant diversi. In *chamæleonte*, uti fertur, penitus disjuncti sunt; sed de hoc animali, cujus inspiciendi fa-

* Fig.
I. ii.

Nervi
Optici
nec de-
cussant
invi-
cem
nec
coales-
cunt.

Insi-
gnes
instan-

tia hoc cultas mihi nunquam
 evin- hætenùs oblata est ,
 cunt. nihil possum pro cer-
 Vesal. to affirmare. In ho-
 l. 4. c. mine verò rem ità se ha-
 4. de bere , ponit extra om-
 corp. nem dubitandi aleam ob-
 hum. servatio *Vesalii*, à me in
 fabric. opusculo priore memo-
 Vide rata; ait enim, in Fœ-
 etiam minâ quâdam quam ille
 Reald. *Patavii* dissecuit , cui
 Co- dexter oculus ab ineunte
 lomb. ætate perpetuâ tabe
 l. 8. marcuerat , sinistro ni-
 c. 3. hilominùs integro per-
 Rio- manente , reperisse se
 lan. nervum (qui à dextro
 An- thalamo ad oculum dex-
 throp. trum pertransit) per to-
 l. 4. tum itineris sui spatium,
 c. 2. & ab
 Rol-

ab origine in cerebro ad *fin.*
 insertionem in oculo, *dissert.*
 multò quàm eum qui si- *Anat.*
 nistrum iter carpebat, *l. 4. c.*
 graciliorem macilentio- *31.*
 remque fuisse.

§. Sed & præter hanc *Fibra-*
 nervorum connexionem, *rum*
 parallelismi servandi cau- *paral-*
 sa à naturâ institutam, *lelif-*
 etiam musculorum situs *mus-*
 admirabilis eidem paral- *etiam*
 lelismo incredibile quan- *per fi-*
 tum inservit. Nam, quod *tum*
 in primis dignum obser- *muscu-*
 vatu est, *lorum*
musculus obli- *adju-*
quus inferior oritur à pe- *vatur.*
culiari quodam *forami-*
ne, in latere orbitæ ocu-
 laris factò, (contrà quàm

in cæteris fieri experi-
mur , qui ab ejusdem
fundo originem arces-
sunt , juxta exitum opti-
ci nervi) quo fit ut ex u-
nâ patte à *musculo tro-*
chleari , ex alterâ verò
ab hujus Musculi com-
modissimâ positione , o-
culus in *æquilibrio* quo-
dam constitutus , irre-
torto obtutu versus ob-
jecta feratur , neque plus
justo accedat versus in-
ternum externumve can-
thum ; quæ quidem *li-*
bratio omninò nulla fu-
isset ; absque hujus Mus-
culi peculiari originati-
one ; (cujus ratio omnes
huc usque Anatomicos
latuit).

latuit) Nam si, ut cæteri
solent, etiam hic mus-
culus à fundo orbitæ ori-
ginem traxisset, conse-
qui debuisset ex tali ori-
ginatione ut oculus per-
petuo strabismo torque-
retur; cui malo *trochlea*
non potuit mederi, imò
tantum abest ut in ea
quicquam esset præsidii
(utcunque hanc senten-
tiam numerus defendat,
& in eam prope omnes
pedibus ferantur) ut è
contrà, *musculus obli-
quus superior*, hujus tro-
chleæ accessione, plus
æquo polluisset; nam
trochlea, secundum le-
ges Mechanicas, à qui-
bus

bus Natura nè latum quidem unguem recedere reperitur, auget ipsius Musculi potestatem, ideoque cum Musculo in societatem operis adducta, sine interventu obliqui inferioris, (hoc ritu positi) nimis fortitèr determinaret oculum versus internum canthum; sed ex ejusdem peculiari situ *libramentum* servatur, & vires utriusque Musculi redduntur æquales. Accidit nimirum per commodum ut hic *inferior musculus* oriatur à *peculiari* quâdam orbitæ *parte*, (quæ tantum cæteris ejusdem partibus den-

densitate præstat, quantum *os petrosum* reliquo cranio) * densior ille quidem sed brevior superiore; & transeat *suprà tendinem* Musculi deprimentis, ne ab eodem in motu & actione impediretur: *Superior* verò, è contrà, longitudine præstat, & habet etiam *trochleam* auxiliatricem, sed *infra tendinem* Musculi attollentis, veluti sub jugum actus, decurrit, unde motus ejus tantundem sistitur & sufflamminatur, quantum *libratio potestatum* postulat, nè oculus in alterutrum canthum, quasi alterum

* Vide Fig. I. in Ophth.

I 5 aver-

averfatus, ſtrabiſmo fœ-
 dus ac deformis incli-
 net.

Summi §. Quicunque autem
Condi- paulò accuratiùs expen-
toris dat ſecum egregium hunc
ſtupen- uſum Muſculòrum in vi-
dum ſione (qui quidem uſus
artifi- hætenus Optico um
cium omnium diligentiam &
inMuſ- acumen fugit) ei admi-
culo- ratio ſtupori proxima in-
rum cutietur ſapientiam ſum-
obli- mi artificis conſideranti:
quo- nam ſi hic inferior muſ-
rum culus, ut cæteri ſolent,
positio- à *tenuiore parte* annuli
ne. orbitalis, verſus fun-
 dum, originem traxiſſet
 (cujus ipſa tenuitas co-
 natu

natu levi præsertim ope
 nervi optici sociali per-
 tusa , transeunti magis
 opportuna videbatur
 quàm ut hoc ritu partem
 densiorem , in latere
 ejusdem orbitæ reper-
 tam , solus pertransiret)
 exinde necessario evenis-
 set , quod est à me supe-
 rius observatum , ut ocu-
 lus (plus æquo hinc in-
 clinans in internum Can-
 thum) perpetuo strabis-
 mo laborâset.

*Quo-
modo*

Porro , sicut hi duo Mus-
 culi obliqui nè alter
 alteri præpolleat à situ
 impediuntur , sic etiam
attollens & deprimens
 (sive ejusdem antagoni-
 sta)

*Mus-
culi
recti
huic
paral-
lelismo
inser-
viunt.*

sta) ei oppositus eodem modo æquilibrium servant; neque officit quidquam huic æquilibrio, quod *attollens* aliquanto major sit *deprimente*, nam, quia minor vis requiritur ad oculum detrahendum quam quæ eidem attollendo inservit, ratâ hinc proportionem potestas utriusque est æqualis: denique quod attinet ad *laterales musculos*, illi cum neque situ discrepent, neque magnitudine, necesse est ut salva sit *libratio*, quæ requiritur ad consensum *concordium fibrarum*, uti supra dictum est.

3. Quin & *insertio fibrarum* Optici nervi in fundum oculi, unà cum exactissimoserierum * distinctarum ordine (prout illæ fibræ oriuntur vel à fastigio, vel à basi, vel à latere thalami optici; quæ de re tertio loco agere instituimus) quæ superius dicta sunt, immane quantum confirmat. Nervus opticus ex duabus tunicis constat, (quarum exterior à durâ matre exorta constituit scleroden, uti interior à piâ, Uveam producit) ut & ex fibris medullaribus quæ in expansione suâ in oculi fundo, ubi in-

Fibra-
rum
inser-
tio in
Ocu-
lum.
* Fig.
1. aa,
bb, cc,
&c. ad
finem
hujus
tracta-
tus.

I 7 run-

runtur ; servantes ordinem feriemque distinctam constituunt *tunicam retiformem*. Hæc quidem tunica negligenter intuenti præbet *substantiæ mucosæ* speciem ; sin verò cyatho crySTALLINO aquâ limpidissimâ repleto imponatur , indeque lumini vel soli obvertatur (postquam ambientes tunicæ penitus præcisæ sunt , itâ ut nihil superfit præter nervi Optici portiunculam , quam *forceps* apprehendat ; cujus beneficio possis eandem susque deque leni motu in aquâ reciprocare) tunc ille , qui modo

Earum distincta expansio in Retinâ per novum Experimentum ostenditur.

mucus

mucus videbatur, in tunicam conversus, seipsum protinus expandet, (præsertim si aqua non-nihil incalescat) & ostendet fibrillas, quas antea celabat, manifestissime distinctas, & serici vel *sindonis tenuissimi* staminibus congruentes, ita ut seriem ubique inconfusam servant, & respondeant totidem partibus objectorum exteriorum, neque unquam recedant ab eo *parallelismo* quem modò diximus necessarium esse distinctæ perfectæque visioni.

Ex his quæ dicta sunt, multa

multa in *Opticis* problemata solvi queant, quorum solutioni (uti mihi videtur) aliorum Hypotheses neutiquam occurrunt.

Nempe unde visio fit simplex à duplici organo.

Unde fit, cum organa visiva duo sint, ut cujuscunque objecti visio non sit duplex?

Resp. Quia *fibræ concordēs*, ut suprà dictum est, *unisonarum* in Musicâ rationem atque naturam habent, ità ut earum utræque à radiis ab objecto percussis & reflexis, eodem tempore & pari, ad sensum, impetu moveantur. Quæ res *Gassendo* tam difficilis visa

Gassend.
de Ap-
par.

vifa est , ut desperaret *mag.*
 penitus de ejus solutio- *solis*
 ne , nisi statueret distin- *hum.*
 ctam visionem *ab unico* & *su-*
 tantum *oculo* , eodem *blim.*
 tempore , præstari ; quod *s. 17.*
 experientiæ manifestò
 refragatur. Nam certo
 certius constat objectum
 ab utrisque eodem tem-
 pore sentiri ; & consen-
 sus *Nervorum Motori-*
orum qui uniuntur in ori-
 gine suâ (& per conse-
 quens etiam Musculo-
 rum ad quos illi nervi
 pertingunt) efficit , ut
 alterutrum oculum ver-
 fus aliquod objectum vel
 aliquam cœli partem
 convertere nequeamus ;
 quin

quin alter ejus cursum ac directionem sequatur.

Vifio Jam verò visionem
perfe- foeliciùs & perfectiùs ab
ctior fit *utroque* oculo quam ab
ab u- *uno* peragi ; constat ex-
troque perimento planè irrefra-
oculo, gabili ; nam fiquis in li-
contra bro vel in chartâ legens
Gaf- uno oculo , utrumque
sendi mox adhibeat (ad om-
sen- nem eam à libro vel à
ten- chartâ distantiam , quo-
tiam. usque unus oculus com-
 modè pertingere legen-
 do potest) sentiet lite-
 ras utrique oculo obje-
 ctas clariorem fui spe-
 ciem exhibere , quam ubi
 folitario unius ministerio
 utebatur ; vel si quis è
 con-

contra, primò utriusque oculi fidem & auxilium impleret, deinde occluso altero, eandem paginam vel objectum idem è *debito intervallo* inspicere perseveret, sentiet paginæ vel objecto illi caliginem derepentè offundi, & speciem, præ illâ, quæ prius apparebat, confusam, tristem ac tenebricosam esse.

Neque obstat huic ex-
perimento experimentum Aucipis sclopeto
rem agentis, qui quo
certius aviculam globu-
lis configat, occluso fer-
mè oculo sinistro, dex-
tro per *diaviliscum* seu
visi-

Ref-
ponso
ad ob-
jectio-
nem.

visivum sclopeti foramen
versus objectum colli-
mat; hoc enim nequa-
quam pendet à ratione
vulgo recepta, & nempe
spiritus visivos oculi oc-
clusi, sociatis viribus &
quasi junctis castris, in-
troire & augere copias
aperti; id quod omninò
fieri non potest, quia fi-
bræ Nervorum optico-
rum ordinem seriemque

* Fig. * distinctam sortiuntur,
I. ii. nequè uspiam vel decus-
santur, vel coalescunt,
vel ductus alicubi com-
munes habent per totum
itineris sui spatium) sed
ejus rei ratio est, quod
foramen visivum sclope-
ti

ti exiguum cùm fit, & ex alterâ tantum nasi parte uni oculo immediatè applicatum, alterius axis opticus non potest per illud dirigi versus objectum; quocircà præstabilius est, ut exclusus à foramine oculus claudatur, quam ut undulans & incertus in positione violenta & præternaturali, invitâ naturâ & seipsâ reclamante, versus collimantis scopum dirigatur. *Unde objectum duplex*

2. Hinc etiam constat quare, altero oculo depresso, dum alter in situ naturali perseverat, objectum duplex videtur? *apparet ab oculo depresso.*

detur? Quia in hoc casu radii impingunt in *discordes fibras*, (utpotè quæ in uno oculo in situ permanentes in altero extra situm & infra eum coguntur) ita ut sibi neutiquam respondeant in sensu superius à nobis explicato, & inde sequitur sensatio duplex, quarum una veram objecti imaginem repræsentat, altera planè falsam, quoad situm ejus; nempe inferiorem, quam debuit, & infra locum naturalem detrusam. Hoc autem non contingere, quemadmodum scriptores Optici hætenus statue-

tuerunt , à fissurâ quâ-
dam *coni refracti* seu *Op-
tici* , (quæ sine dubio
in causâ esset , ut duæ di-
versæ imagines impri-
merentur super retinâ
ejusdem oculi depressi)
ex eo , luce clarius cog-
noscitur , quod *hæc du-
plicitas* , (si oculus , qui
integer & in situ est,
claudatur) extemplò eva-
nescit ; quæ res à nemi-
ne Opticorum hætenùs
animadversa , eorum sen-
tentiam non redarguit
modò , sed manifestissi-
mè obruit & pessundat. *Obje-*

Sanè in vulgari expe-
rimento *chartulæ* fora-
minulis *pertusæ* & inter-
posi-

*ctioni
occur-
ritur.*

positæ inter oculum & objectum, objectum illud vel duplex vel multiplex apparere potest, pro numero puncturarum quibus charta interstingitur, quæ efficiunt totidem *distinctos conos* (planè ut in *conspicillis multiplicantibus* videmus) incidentes in totidem discordes fibras *ejusdem retinæ*, & apparent illi coni perindè multiplicati sive aperto altero oculo, sive clausò; verùm enimvero, cùm hoc non contingat *nudo oculo* objectum inspicienti, ut in casu jam proximè supra memorato, fed

sed interventu alterius
cujusdam corporis (ad
modum, uti diximus, *con-
spicilli multiplicantis*)
perstat incolumis conje-
ctura nostra, quicquid sit
de hoc experimento,
quod à nostro casu peni-
tus alienum, suas res si-
bi habet, solutione no-
strâ illæfâ & integrâ ma-
nente:

Multa alia ejusmodi
experimenta in medium
afferri possunt, in quibus
ut in instantiâ *oculi de-
pressi*, duplex sensatio
contingit (sc. ex *paral-
lelismo, læso*) & quo-
rum alia probabilis ratio
vix ac ne vix quidem po-
test,

In- test adduci. Referam,
stantia si placet, ex iis pauca
infi- quædam, ut aliquantif-
gnes per sitim Philosophicam
ad hy- restinguam, quæ super-
pothe- sunt in *uberiorem* super
fir- hoc argumento *tracta-*
man- tum, Deo volente faven-
dam. teque servaturus.

Barth. *Borrichius* meminit
Act. ægri cujusdam, suæ curæ
Med. concrediti, cui paulo an-
Vol. 2. te obitum (quando spiri-
Obs. tus incerto ac *desultorio*
80. *motu* cientur, ut in te-
mulentis videre est) cun-
cta in cubiculo duplicia
videbantur; nempe idem
objectum eodem tempore
apparebat in situ & sub-
limi & humili colloca-
tum;

tum; quod præfidenter dico, contigisse ex debilitate spirituum animalium, ità ut non possent utrosque *Nervos; & Musculos motores* certo & æquali impetu cedere, unde necessario fiebat ut pectus abiret parallelismus iste, quem nos supponimus necessarium esse distinctæ legitimæque visioni: nam hic nulla potuit subesse alteratio *crystallini humoris,* * quam tamē sententiam in casu non absimili fautores suos habuisse non me latet.

* *Vid.**Hercul.**Saxon.**Præl.**pract.**part. 13**c. 20.**sect. 8.**Barth.**Act.**Med.*

Idem vir doctus & ingeniosus meminît etiam

K 2

alte

Vol. 3. alterius cujusdam, qui si-
 Obs. mili symptomate afficie-
 20. batur; *quod subito ipsum*
(verba sunt Borrichii)
invasit Tabacum e fistu-
lâ sugentem. Probabile
 est utique repentinum
 fluxum humorum deci-
 disse in nervum ex eâ
 parte, quâ suctio fiebat,
 quamvis id *Borrichius*
 in incerto reliquit; ait
 autem exaruisse peni-
 tus istum humorum flu-
 xum, post usum *caput*
Purgantium & Pulve-
ris nasalis Bartholini:
 verosimile est igitur hu-
 mores istos, qui nervum
 ex eâ parte nimium rela-
 xabant, ita ut tensio
 ejus

ejus tensioni ἀντισίχῃ sui non amplius responderet, aliorsum fuisse derivatos, & consequenter symptoma defuisse.

Forestus militem *Lu-* Lib.
tetiae Parisiorum sibi II.
 notum memorat, qui *Obs.*
 longo frequentique luxu 39.
 ac libidine solutus in oculi dextri *prolapsum* incidebat, ita ut (Medicis ad casum insolentem attonitis ac stupentibus) cuncta ab illo *duplicia* cernerentur, excepto, quando oculus ille dexter claudebatur, neque illi hilum profuit vel *purgatio*, vel *venæ sectio*, vel aliud quicquam quod

illi in remediū hujus mali
offerebatur , donec ad-
hibitis *Cephalicis* & *ex-*
siccantibus remediis bre-
vi tempore perfanatus
est. Nempe causā utri-
usque quā symptomatis ,
quā remediū , ex iis quæ
diximus facillimè inda-
gatur : nam ab eo dextri
Oculi *prolapsu* , cū
Musculi & Nervi Mo-
torii præ intemperie
humoris , nimis laxa-
rentur , actum est con-
festim de *æquilibrio* ner-
vorum optidorum , &
æger ille oculus eodem
recidebat , quoad *paral-*
lelismum , ac depressus
iste quem supra memora-
vimus;

vimus ; necesse igitur erat ut objecta ab ægro duplicia cernerentur , propter rationem superius allatam. idcirco autem ultima curandi methodus erat aliis omnibus omninò anteponenda , quia per hanc nervi , humoribus exsiccatissimis , firmitudinem tonumque naturalem recipiebant : unde oculus ille dexter ad naturalem positionem redibat , sive, quod idem est , ad parallelismum istum quem toties diximus, necessarium esse distinctæ visioni.

Sed mirum est præ* omnibus quod ait * *Agui-* tic. p.

K 4 *lonius*, 346.

lonius, vidisse se juvenem cui objectum cominùs oblatum simplex videbatur (& id quidem recte) sed eminus simplex ; deinde addit, observâsse se nullum in oculis ejus defectum, præterquam quod *humore* nimio scaturirent. Ne-
 fas esse existimo fidem viri magni in dubium vocare, & idcirco si juvenis illi non imposuit) dico hoc effectum potuisse sequi ex debilitatâ tensione Musculorum, humoribus eousque mandentium & manantium ; ut objecta non potuerit eminùs contueri ; quia
 major

vid.

Ges-

ner.

lib. 3.

Epi-

stol.

117.

unt; sed ea satius duci-
major vis requiritur pro-
spectui longinquo quàm
vicino, ut experienciâ
quotidianâ compertum
est, oculis nostris citiùs
fatiscantibus obtutu ob-
jectorum è longinquo
apparentium, quam eo-
rumquæ juxta visuntur.

Multa alia in *Opticis* Vid.
difficillima problemata *Misc.*
ex hâc Hypothesi facilli- *curios.*
mè solvi possunt, (ex *Germ.*
aliâ quavis neutiquam *ann. I.*
solvenda) quinetiam & *Obs.*
multa alia experimenta *71. &*
in proclivi esset adduce- *93.*
re, si id nunc ageremus, *Plemp.*
quæ ad sententiam no- *Ophth.*
stram adstruendam faci- *lib. 4..*
mus *Probl.*
15.

Zacut. mus tantisper præterire,
Lufit, donec videamus, quo-
tom. I. modo hæc quæ scripsi-
lib. 5. mus, à Philosophis ex-
quest. cipiantur, ut eadem o-
17. perâ eorum objectiones
Willis diluamus, & una sen-
de ani- tentiam nostram, addu-
mâ ctis pluribus experimen-
Bruto- tis, extra omnem con-
rum troversiaæ aleam in tuto
cap. collocemus. Verùm il-
15. p. lud diligenter animad-
219. verti velim, quod cùm
in fibræ nervorum optico-
quar- rum negantur à nobis
to. * *vid.* mutuò * *decussari*, hoc
Fig. I. tantum in genere dictum
ii. à nobis esse, καὶ ὡς Πιτὰ
 πλείον : hanc enim in
 Afellis (*Whitings*) & in
 aliis

aliis fortasse quibusdam
 ex aquatiliū genere,
 decussationem reperiri
 non admodum inficias
 iverim; tamen in multis *Hypo-*
 piscibus rem aliter se ha- *theseos*
 bere evidenti sensuum *nostræ*
 testimonio manifestum *ulteri-*
 est; & quod ad homi- *or ex-*
 nem attinet; *Vesalii* ob- *plica-*
 servatio suprà memora- *tio, ut*
 ta vetat nos ultrà ferram *obje-*
 reciprocare; quid quod *ctioni-*
decussatio nervorum in *bus*
 piscibus supradictis ni- *qui-*
 hil officit assertioni no- *bus-*
stræ? Nām *congrua quæ-* *dam*
dam tensio nervorum in *occur-*
 protuberantiis thalamo-
 rum optícorum, non
 adeò difficilis intel-
 lectu

lectu erit, etiamsi eorum decussatio concedatur : Imò decussati fortasse vehementiùs firmabunt opinionem nostram.

Porro cùm *parallelismi* vocem toties usurpem, ità velim intelligi, non ut *pupillæ* utriusque oculi, sed ut *retinarum fibræ correspondentes* eundem ad objectum respectum habeant; quod si non fiat, potest objectum duplex apparere, etiamsi pupillæ parallelismum servent, neque altera infrâ alteram detrudatur; nam si oculus prematur lateralitêr versus alterutrum canthum, ob-

jectum

jectum in eo casu duplex apparebit , (non minùs quam si deorsum vel sursum premeretur :) ratio est ; quia figurâ oculi quomodocumque mutatâ , positio *fibrarum* , quæ sunt in retinâ ejus unâ mutatur , respectu habito ad fibras *ἀντιστοιχίας* nam sequitur omninò ex illâ mutatione , ut aliæ ex fibris altiores justo ; aliæ autem inferiores factæ , parallelissimum utrobique pariter evertant.

Denique etiam illud , ut observes , precor ; quod cùm asseram *interitum æquilibrii ocularis*

Unde
fit,
quod
dupli-
citas
oritur
à Stra-
bismo
morbi-
do, seu
violento;
à
natu-
rali
verò
non
idem
fit.

in causâ esse, ut ob-
jectum duplex videatur;
hoc universaliter verum
non esse; sed tantum si
intereat ad *certum gra-
dum*; hoc est, eò usque
ut vel objecti integra
imago, vel saltem pars
potior & major ejus in-
cidat in retinæ *discordes
fibras*: nam exigua & le-
nis oculi in quamcunque
partem pressura non effi-
cit duplicitatem in obje-
ctis, non magis hercle
quàm Strabismus *natu-
ralis*, vel ulla alia oculi,
quæ vehementior non
fit, in alterutrum can-
thum inclinatio. Quod si
Strabismus oriatur à spa-
smo

Imo vel * *paralyfi* Mus- * Con-
 culi Motorii, post validas *sule*
 & frequentes convulsio- *Autho-*
 nes nervorum (in quo ca- *res*
 fu distortio semper ma- *modò*
 jor est & *violentior*) tunc *cita-*
 objecta perpetuò gemitos, &
 nantur: uti etiam ab e- *Plater.*
 briis & Maniacis (quo- *Ob-*
 rum spiritus animales *serv.*
 inæquali motu cientur, *lib. 1.*
 & musculi vibrantur tre- *P. 123.*
 mulâ & incertâ recipro-
 catione, pereunte æqui-
 librio ad datam propor-
 tionem) objecta semper
 duplicia conspiciuntur,
 licet in utroque casu non
 contingat, nisi æquili-
 brium ad certum gradum
 destruatur: similiter *le-*
viuscu-

viuscula digitorum *decussatio* simplicem globulum , duplicem non facit , sed in perfectâ & *integrâ* decussatione duplicitas ista nunquam non sentitur,

Expli-

*Explicatio Figuræ 1.
ad finem hujus Tra-
ctatûs appositæ.*

A *a, b b, c c, &c.* Fi-
bræ concordēs Ner-
vorum Opticorum (à
similibus partibus tha-
lamm Opticorum
llll utrinque oriundæ)
quæ itidem terminantur
in partibus similibus utri-
usque oculi, & descri-
buntur iisdem charactēri-
bus; ubi notandum est
a a designare duas *supre-
mas Fibras*; quæ maxi-
mam tensionem & flexu-
ram habere supponan-
tur, licet id *in plano* non
potuit.

potuit commodè repræsentari.

bb, cc; dd, sunt Fibræ laterales externæ; *ee, ff, gg*, laterales internæ.

llll, binæ protuberantiæ (*Thalami Nervorum opti-
corum* dictæ) unde nervi optici originem fortiuntur.

hhhh, cerebri partes utrique thalamo subjectæ.

ii, Nervi optici hîc paulò majore specie delineatî, quo plures eorum fibræ distinctè repræsentarentur.

† Locus coalitionis, à quo tamen nonnihil in alterutram partem diffunditur
lire

lire supponuntur, ut eo evidentiùs appareat distincta series fibrarum utriusque nervi.

§ Literæ *aa*, *bb*, *cc*, &c. in oculis repræsentant fibras concordēs utriusque *retinæ*, à thalamis opticis ad oculos productas, quamvis earum plures mente suppleri debent, (nempe in linearum intervallis) quæ non potuerunt characteribus in hac figura distinctè repræsentari.

mm, Oculi tunicâ *sclerode* & *uveâ* nudati, ut supradictæ retinarum fibræ (quæ in *processibus ciliaribus* terminantur) eo


eo manifestiùs clariusque
se ostendat.

nn, Processus ciliares
immediatè *iridi* subjecti;
quæ propterea in hac fi-
gurâ præcisa supponitur,
& è medio sublata.

oo, Pupillæ.

N. B. quod sicut *aa*
repræsentant *supremas*,
& *bb*, *cc*, &c. *laterales*
fibras concordēs, in supe-
riore oculi Hemisphærio
repertas; sic etiam ex
adverso supponi concor-
des alias in Hemisphærio
inferiore (quæ in hac fi-
gurâ exhiberi non pos-
sent) quarum *infimæ duæ*
conciipiuntur fibris *aa* ex
diametro oppositæ.

Con-



Continuatio Theoriæ præcedentis, in quâ Hypothesis nostra firmitus adstruitur & simul occurritur objectionibus, quas doctissimi iidemque amicissimi viri contrâ eandem attulerunt.

Cum in Theoriâ præcedente cogitationes meas circa naturam, causas, modumque visionis emiseram in lucem *, constitui mecum, specimine

* In

Dni,

Hookii

Col-

lect.

Philo-

soph.

nº.6.

edit.

Hac
Theo-
ria no-
stra
conti-
nuatio,
operi
insecu-
turo
(de usu
par-
tium
oculi,

mine isto qualicunque
aliquantisper contentus,
nihil amplius de eâ re pu-
blici juris facere, donec
integrum justumque o-
pus (de *particulari par-
tium oculi usu* in visione)
ad exitum perduceretur;
cui quidem operi, sicut
per otium licuit, jam diu
est quod animum adjeci.
Verùm iste labor, cùm
sit tam varius, & multi-
plex & suprâ modum
subtilis, multorum an-
norum res est, & ætatis
in studio naturæ conse-
nescentis. Utilis ille cer-
tè & jucundus labor, &
& si quis alius, dignus phi-
losophorum curis & vi-
giliis,

giliis, five admirabilem
ejus copiam & varietatem
spectemus, five u-
sum quem præstabit sa-
pientibus & bonis, ad
impietatem seculi retun-
dendam, & ad tollen-
dum è medio Scepticif-
mum.

Igitur si quando sup. *De e-*
petat idonea seges expe- *jusdem*
rimentorum & observa- *morbis*
tionum, five illæ se nò *seu af-*
bis indagantibus obtule- *fecti-*
rint, five ab aliis fide di- *bis)*
gnis fuerint acceptæ, ad- *com-*
dam insuper *Pathologi-* *modè*
am oculi, ut opus istud *præ-*
nostrum (quoad fieri po- *mit-*
test) omnibus suis nume- *tenda.*
ris partibusque absolu-
tum,

tum fit, eòque gratius & acceptius erudito orbi. Intereà verò temporis patior me vinci ab amicis flagitantibus, ut Theoriæ planè novæ & ideò difficili, addito auctario, novum lumen accendam, & simul diluam objectiones eruditorum, quibus illi Hypothesin nostram gravare sunt dignati.

Ejus-
dem e-
lucida-
tio.

In eo, quem dixi, brevi apparatu, id egi, ut ostenderem; primò, *Fibras, nervi optici*, prout oriuntur à *binis protuberantiis* thalamorum opti-
corum, plus ad visionem conferre, quàm *corneam, humores*, aut *retinam,*

nam , (quatenus illa Ex
 à Scriptoribus Opticis præ-
 considerantur) non so-^{misis}
 lum quia sensatio in ce-^{obser-}
 rebro præcipue perfici-^{vatio}
 tur, cui tunicæ & humo-
 res transfennarum qua-
 rundam vicem & mini-
 sterium præstant , ve-
 rum etiam , quod expe-
 rientia constet , in ἀμυ-
 πώλει five guttâ serenâ,
 tunicis & humoribus re-
 ctè se habentibus , (nam
 oculus in eo casu ad vi-
 sum sanus & integer vi-
 detur ,) visionem tamen
 penitus interire : Necesse
 est igitur , cum cæte-
 ra nihil obstant , ut fi-
 bræ prædictæ in eo ocu-
 lorum

* Vid.
Bonet.
sepul-
chret.
tom.

1. lib.
1. sect.
18.
obs.
1. 3. 5.
& 8.

lorum morbo præcipuè
sint affectæ; sive * quod
meatus earum obturen-
tur; sive quod circa *Tha-
lamos opticos* origines &
radices earundem plus
æquo comprimantur ab
aliquo tumore; vel quod
in arctum cogantur à tu-
nicis exterioribus nervo-
rum opticorum nimium
contractis & extenuatis;
vel denique à confusione
quavis aut violentâ con-
tortione fibrarum prædi-
ctarum.

Obs.
2^{da}.

2. Ostendimus ibidem,
superiores fibras utrius-
que Thalami maximam
in utroque tensionem
obtinere, *inferiores* ve-
rò

rò minimam; uti cuivis
 facile constare potest ex
 eo, quod superiores ori-
 antur à thalamo supre-
 mo, quo fit; ut maxi-
 mam flexuram habeant;
 inferiores verò ab infimâ * *Vide*
 ejusdem parte, unde & *fig. 3.*
 flexionem minimam for- *ad fi-*
 tiuntur: id quod etiam *nem*
 sensu manifestum erit, *appo-*
 cuivis eas cerebri partes *fit:*
 intuenti *; unde conse- *ubi a.*
 quens est, ut alterna con- *fibras*
 gruitas duarum superio- *supre-*
 rum & inferiorum fibra- *man,*
 rum, quoad situm & ten- *notat,*
 sionem, efficiat ex simi- *b infi-*
 li utrobique motu, ex *mam,*
duabus imaginibus *unam* *c. Ner-*
 in visione, aut saltem, *vi Op-*
 portio- *tici*
 quæ *nem.*

quæ quod una non sit,
non potest ullo sensuum
testimonio comproba-
ri.

Ter-
tia.

Ubi ob-
jecti-
oni oc-
curri-
tur.

* dd

cum

gg col-

lata

in fig.

I.

3. Monuimus inter-
medias five *laterales fi-
bras* ejusdem oculi, ut-
cunque sibi invicem ex
diametro oppositas, ta-
men ex flexurâ majore
* externarum fibrarum,
quam earum quæ interiùs
reperiuntur, quoad sen-
sionem nonnihil discre-
pare; unde stellæ duæ
vel alia quævis bina cor-
pora à fibris lateralibus
ejusdem oculi (occluso
altero oculo) simul con-
specta, apparent tamen,
sicut sunt, distincta & ab
invi-

invicem diversa, nec in visione ullatenus uniuntur, quia cernuntur per *fibras discordes ejusdem oculi*, qui porrò in orbità suâ tam arctè amplectitur à partibus ambientibus, ut aliter sanè fieri haudquaquam possit.

4. Observavimus de *Quar-*
nervis opticis, oriri eos *ta.*

* *separatim* à duabus qui- * *Vide*
busdam cerebri Molecu- *l, l, l, l.*
lis; quæ quidem eorum *in fig.*

peculiaris originationis in *I. ad*
negotio visionis maxi- *finem,*

mum iis commodum &
adjumentum præstat;
nam certè cùm cæteri
nervi *in plano* oriundi à

L 3 cere-

cerebri fundo initia capessant, & à se mutuò multo propiore intervallo distent, ratio suadet in tam insigni sitûs & originis discrepantiâ, eam à naturâ non temere fuisse factam, sed consultò, & propter finem quendam certum & peculiarem.

*Cur
tàm
exqui-
situs
fibrarum*

*optica-
rum,
præ
aliis,
appa-
ratus.*

Nempe, optici nervi quo certius in motu & usu consentirent, desiderabant utrobique fibrarum congruam & æqualem

tensionem, absquẽ quo fuisset, (cùm hi nervi oriantur separatim, à duabus distinctis & oppositis cerebri Moleculis) ut objecta semper duplicia

cer-

cernerentur: cæteri verò nervi cum sint in originibus confertiores, (unde fit ut fibræ earum mutuos secum invicem motus & impressiones communicent) vel aliis fortasse sensibus operam locantes, quorum non est tam acris & exquisita sensatio objectorum ac in visione, non opus erat illis tam accuratâ & subtili dispositione aut tensione fibrarum quæ ab illis oriuntur.

5. Quod attinet ad positionem fibrarum, quæ in nervis opticis inveniuntur, diximus eas perpetuò observare ordi-

L 4 nem

nem seriemque distinctam, ità ut impermixtæ maneant & planissimè distinctæ etiam in ipso contactu, ubi tamen coalescere confundique statuuntur à Scriptoribus quibusdam (sine experientiâ duce frustra indagantibus *causam unionis* in visione.) Nam distinctionem istam perpetuam nervorum, omninò certissimam comperitissimamque esse præter ea quæ de hominè, ex *Vesalio*, *Riolano*, aliisque superius observata sunt, constat ex ipsius naturæ testimonio in Chamæleonte, ut & in multis

multis animalibus ex a- *Quare*
 quatilium genere, quæ *in pi-*
 sunt debilioris notæ, in *scibus*
 quibus nervi optici, ubi *mino-*
 se omnino proximè at- *ribus*
 tingunt, tamen vix ac ne *& qui-*
 vix quidem juncti repe- *bus-*
 riuntur. Visa est nimi- *dam*
 rum indulgentissima ma- *aliis*
 ter & altrix omnium na- *ani-*
 tura, in his & hujusmo- *malcu-*
 di debilioribus animal- *lis*
 culis, sui operis imbecil- *Nervi*
 litati prospexisse, atque *Optici*
 eo consilio oculos illis *non*
 tribuisse paulo laxiores, *tam*
 & facilius in partem *arctè*
 quamcunque se torquen- *uniun-*
 tes; ut & hostes eo dili- *tur ac*
 gentius caverent ex om- *in ho-*
 ni plagâ certatim ingru- *mine.*

L 5 entes,

entes, & prædæ inhærent secundo flumine temerè delabenti. Quæ autem animalia nervos opticos habent propius coalescentes, ea species objectas distinctius intuentur, quia *axis opticus* in hoc genere constantius & intentius collimat versùs unam partem; quod autem ad alimentum eorum, vel incolumitatem & præsidium ab impetu hostili spectat, aliter iis à naturæ benignitate provisum est.

Sexta. 6. Diximus in insertione fibrarum earundem in oculum (ubi earum sub-

substantia Medullaris *retinam* constituit) eandem , quæ priùs , distinctionem seriemque servari ; quæ certè distinctio plurimum juvatur , non solùm ex eo quod prædictæ fibræ desinunt in *processus ciliares* & iisdem implicantur , verùm etiam à tenuissimis quibusdam *fibris transversis* , quæ * in figurâ nostrâ non repræsentantur , quæque fibras in longum decurrentes & in eadem descriptas , † (naturâ telam affabrè texente,) reticulari quodam ac tessellato opere connectunt , & faciunt

* Vid.
fig. I.
ad finem.

† a, b, c, d. &c. in eadem figurâ, dire-

hæce ut integra tunica in cya-
retina tho aquâ limpidissimâ
fibras repleto constituta, *sindo-*
exhi- *nis tenuissimi* speciem
bent. præ se ferat, sicut est à
 nobis suprâ indicatum.

Nemo, quod sciam,
 ante me incidit in hoc
 experimentum †; qui-
 cunque autem nobis qua-
 si manu ducentibus in
 eodem postea recolendo
 operam posuerunt (per
 quem profecerant, ut in-
 genuos decuit, nequa-
 quam profitentes) no-
 strum in ejusdem com-
 memoratione institutum
 perperam sunt interpre-
 tati. Nam ideò certe re-
 tinam indimus in aquam,
 non

† In
Oph-
thalm.
 p. 30.
 A. D.
 1676.
Edit.

non ut ejusdem *Mucum* abluamus, qui illi sanè proprius & naturalis videtur; sed ut expandamus fibras ejusdem humore simul emollitas & auctas, leni ac reciproco in aquis motu, & ut superficies ejus, quo opportunior conspectui reddatur, crescat in magnitudinem; ex *duplici refractione* radiorum lucis, transeuntium per eam & per phialam ambientem.

Ablui sanè nonnihil visci cujusdam aut *uliginis albæ*, dum retina lavatur, frustra sim, si inficiari velim; & hæc qui-

dem adimplet interstitia
 fibrarum , & eam tuni-
 cæ densitatem impertit ,
 quæ facit , ut in eâ radii
 certius terminentur , in-
 tercluso nimirum transi-
 tu in *Choroëidem* ; (quæ
 res diligentius animad-
 versa, *Mariottinæ ob-
 jectionis* , de qua pluribus
 postmodum agemus , aci-
 em retundet) & hic qui-
 dem defluus è Nervo
 optico humor tunicam
 fortasse prædictam pas-
 cit, ut pro *Succo* quodam
Nutritio non immeritò
 habeatur. Quicquid sit,
 hæc tunica ad sistendas
 species & radios in ipsâ
 sui substantiâ terminan-
 dos

dos non minus aptè à naturâ comparata est, quam in laternâ *papyrus oleo perfusa*; quæ ad pellucidæ naturam proximè accedens, tamen sistit radios, & *imagunculas versatiles* ordine repræsentat. Porro, versus fundum oculi fibræ hujus tunicæ confertiores sunt, & se mutuò propius contingunt; in hac autem parte sensatio objectorum, longè quàm alibi plenior est & perfectior, id quod (habito etiam ad figuram ejus respectu) adegit nos * olim, ut Philosophicâ libertate usi, novâ & inauditâ for-

* In

Oph-

thalm

p. 28.

vid. ib.

f. in

fig. 2.

tasse ad id temporis appellatione, hanc partē *pupillam inversam* vocaremus. Situs ejus in hominibus *pupillæ è diametro oppositus* reperitur, profitu optici nervi in * *schemate primo* eorum, quæ ad hujus opusculi calcem subjiciuntur; sed in brutis *obliquior* est, propter insertionem optici nervi propiorem quàm in hominibus *interno cantbo*; quò fit, ut nonnunquam, sicut in *equis* ex improvviso *resilientibus* videre est, cogantur oculos pro re natâ torquere, ut eo clarius distinguant objecta vani timoris.

* Vid. fig. 1. ad finem hujus tractatus.

7. Cùm

7. Cùm dico *fibras septi-intermedias* gradatim *ma.*

tenfiores remiffioresve
effe, prout eæ thalamum
fupremum propiùs con-
tingunt, aut ab eodem
longiùs removentur; ta-
men illud velim diligen-
tiffimè attendas, tenfio-
nem iftam inferiorum fi-
brarum proportionè a-
dèò minutâ & infenfili
laxari, ut in his fibris quæ
proximè abfunt à thala-
mo fupremo, vix ulla
reperiatur (quæ quidem
fensu manifefta fit) diffe-
rentia quoad apparen-
tiam, & fitum objecto-
rum; in his autem quæ
ab eodem paulo longiùs
distant,

distant, major est & clarior illa differentia & quasi parallaxis objectorum; & in iis quæ longissimè removentur, maxima. Præterea, etiam illud observatu dignum est, parallaxim istam ab incongruâ & inharmonica tensione fibrarum in *thalamo optico*, potius quàm ab earundem in *oculo* variâ expansione desumi. Nam sicut oculus objecta contuetur auxiliò *interni conii visionis usus*, potius quàm *externi*; sic anima, nisi fallor, judicat de eisdem extrinsecus ingruentibus, eademque à se invicem discrimi-

discriminat ac discernit ,
 deque eorum distantia ,
 situ , & ad vicina corpora
 multiplici respectu
 pronuntiat, non tam per
eam fibrarum *extremi-
 tem* quæ *organo* inserta
 cernitur, quam per *eam*
 quæ ipsi *cerebro* implici-
 ta, & habitans in ipsis
 animæ penetralibus, im-
 mediatè eam afficit , &
 circa commune sensori-
 um terminatur.

o. Quando τ *ἰσωνία* octa-
 (quæ & *ἰσότης* dici po- va.
 test) fibrarum *ἁντιόχων*
parallelismum earundem
 voco , cave, intelligas,
 de parallelismo propriè
 strictèque mathematico,
 sed

sed tantum (ut memini etiam me olim monuisse in superiore tractatu) de *æquilibrio* earum, hoc est, æquipollentiâ quâdam, sive æquali potestate ex eodem utrobique situ ac tensione orâ; quamobrem si fibræ istæ rectilineæ fuissent, (aut non, ut nunc sunt, curvo tramite ac figurâ præditæ) dixissem potius de iis, ut mathematici solent, quoties de parallelis lineolis loquuntur, quod essent in *eodem plano* constitutæ. Sed non est ut sim tantoperè sollicitus de minutiis verborum, præ-

præsertim cum aptius
 fortasse verbum frustra
 desideretur, modò res
 ipsa in ambiguo non
 sit. Prætermisissis igitur
 captiunculis criticorum
 (quæ, nunquam con-
 tentæ, nusquam confi-
 stentes, ipso sui fastidio
 laborant) confero me ad
 objectiones, non ex re-
 rum imaginibus & signis,
 sed ex ipsis rebus, ex ip-
 sâ naturâ depromptas,
 quas mecum pro suâ hu- ^{obje-}
 manitate primus com- ^{ctiones}
 municavit, vir suo meri- ^{senten-}
 to clarissimus *Isaacus* ^{tiam}
Newtonus, Matheseos ^{no-}
 in Almâ *Cantabrigiâ* ^{stram}
 professor *Lucasianus*, ^{impu-}
 gnante ^{deinde} res

*expen-
dun-
tur,*

deinde alii passim viri undecunque doctissimi, iidemque mihi non minus amicitia, quam communi studiorum necessitudine conjuncti, qui partim libertate Philosophicâ & amicâ usi, partim, à nobis, ut id facerent flagitantibus lacessiti, quo minus in sententiâ nostrâ acquiescere possent, rationes, causasque, quæ sequuntur, attulerunt.

*Obje-
ctio
prima.*

Prima objectio proposita est in collegio Greshamensi in conventu Philosophorum Regiæ societatis, tunc quando Hypothesis nostra pro
more

more societatis, examini philosophico subjiceretur. Erat autem hujusmodi, *viz.* 'difficilem
' prorsus rem intellectu
' esse, quomodo molliculæ istæ Nervi optici
' medullares fibræ tensionem tam validam &
' prope fidicularem, citrà
' separationem partium,
' obtinere possent.

Verum ista tensio, si *Re-*
rem sine partium studio *spon-*
æstimemus, perinde facilio: *sio:*
cilis intellectu erit, ac ea
quæ cernitur in *araneæ*
tela, cujus *mucosa species*, & *expansio tessellata*, ipsi *retinæ* in habitu
legitimo ac naturali constituitur.

stitutæ examussum quadrat; & sicut *spiritus* è quavis plagâ vix spirans. (ac nisi per ipsam stetisset, insensilis) telam movet: ità levissima quævis *materia æthereæ seu lucidæ aura* retinam secum agit, & instinctu quodam afflatuque cœlesti eandem vibrat, flaminis ætherei motibus hoc ritu obsequentem.

‘ Quinetiam in eodem
 ‘ celebri conventu ulterius
 ‘ objectum est, *thalamum opticum* (mollis-
 ‘ culus cum sit, & ex *medullari substantiâ* con-
 ‘ flatus) non posse fibris
 ‘ circumpositis (& à sum-
 ‘ mo

‘mo ejus apice , vel ab
 ‘imâ bafi , vel à locis in-
 ‘termediis , diverfimo-
 ‘dè decurrentibus) ten-
 ‘fionem pro ratâ pro-
 ‘portione diffimilem im-
 ‘pertire.

Sed experimento con-
 flat, fi quis acû vel for-
 cipe ufus nervorum op-
 ticum, (pro fitu fuo &
 itinere verfùs oculum)
 traxerit antrorfum ,
periores fibras ægriùs
 obfequium attrahenti
 dextræ præftare , quàm
 ex quæ à *lateribus* naf-
 cuntur. Enimverò *Na-*
tura (feu potiùs parens
 & opifex naturæ Deus)
 fubtilior & minutior eft

M in

in operibus suis , quam
ut cogitatio nostra cali-
gans & incerta , offusa
nebulis opacæ carnis , &
molis terrenæ pondere
præpedita , in iisdem pro
subtilitate sua contem-
plandis , dignè se exerere
& exercere possit. Quod
cum ubique verum sit ,
tamen nullibi verius ,
quàm in hujus organi
structura , cujus omnes
partes tam commodè
& concinnè ad visionem
producendam , provi-
dentiâ *summi artificis*
elaboratæ sunt , tam stu-
pendo ac prorsus divino
apparatu compositæ , at-
que ubi omnia in *Mini-*
aturâ,

aturâ, ut ità dicam, tam delicatulâ delineata sunt, & ab ejus dextrâ quasi leniter transeunte tam subtiliter simul & affabrê demulsa; ut oculus tantum præstet cæteris corporis humani membris, quantum corpus humanum præstat rudiori, si illud spectes, mundi aspectabilis moli.

‘Urgent alii; si superiores fibræ tensiores Obje-
ctio
‘essent, quàm eæ quæ secun-
da.
‘inferiùs reperiuntur;
‘sequeretur omninò vi-
‘sionem istam clariorem
‘distinctionemque futu-
‘ram, quæ fit per radios
‘impingentes in superio-

M 2 rem

‘ rem quàm per eos qui
 ‘ incidunt in inferiorem
 ‘ Retinæ partem ; vel
 ‘ quod eodem recidit,
 ‘ objectum infrà oculum
 ‘ nostrum constitutum (in
 ‘ quo casu radii ab eodem
 ‘ rectà transeuntes ter-
 ‘ minantur in fibris su-
 ‘ premis) manifestiorem
 ‘ fidelioremque sui spe-
 ‘ ciem exhibiturum, quàm
 ‘ si idem objectum supe-
 ‘ riùs collocatum emit-
 ‘ teret ex se radios in fun-
 ‘ do Retinæ ocularis vice
 ‘ versà desinentes.

Resp.

Cui quidem objectio-
 ni ego sic respondeo, ut
 id omne quod objicitur,
 planè concedam, & ob-
 jectori

jectori gratias, quas debeo, referam, quod mihi pro objectione argumentum dederit, & ejuscemodi argumentum, ut aliud certè nullum excogitari possit, in quo Hypothesis nostra, quando undecunque præsidia conquirat, tutius confidat, & de quo (cum ipsius verecundiæ pace, & veniâ pudoris) justius triumphet rectiusve glorietur. Provoco enim ad experientiam cujusvis, utrùm in libro *literulæ* non clariùs se ostendant, & faciliùs legantur, ad sesquipede-strem infrà oculum di-

M 3

stan-

stantiam sitæ , quam si tantundem suprâ locarentur? Sive annon facilius discernat aut deprehendat objecta , quæ in eadem utrobique luce visuntur , infrâ pupillam collocata , quàm suprâ? Id quod etiam ulterius firmatur per experimen-

* *In* * *Veru-*
Histor. *lami* nostri ; qui ait , si
natur. duo homines ita consti-
Cen- tuantur , ut alter infe-
tur. 3. rius in humili glebâ con-
Expe- sistat ; alter in sublimi
rim. 5. fastigio , vel speculâ vel
 quovis edito & excelso
 loco ; major ac distin-
 ctior apparebit despe-
 ctus fastigato , quàm
 suspi-

‘ fufpicienti ille alter qui
 ‘ eft in excelfo culmine
 ‘ conftitutus.

‘ Opponitur tertio ; fi Ob-
ject.
3^a.
 ‘ vera funt quæ fupra di-
 ‘ ximus de fitu fibrarum
 ‘ ἀντιόχων, fieri & ut radii
 ‘ ab objecto (ex. gr. à la-
 ‘ tere *oculi finiftri*) col-
 ‘ locato non poffent in-
 ‘ cidere in *concordes fi-*
 ‘ *bras in dextro*, vel è
 ‘ contrà ; nam in hoc fitu
 ‘ radii non poffunt im-
 ‘ pingere in *fibras* utriuf-
 ‘ que oculi *interne-late-*
 ‘ *rales*, fed in *internas*
 ‘ unius, puta finiftri, &
 ‘ in externè laterales
 ‘ dextri, quæ res effice-
 ‘ ret duplicem percepti-

M 4 onem.

onem. Et sanè prævisa à nobis hæc objectio in diatribâ superiore, fecit ut diceremus, *nihil detrimenti capturam opinionem nostram, siue nervi optici decussentur, siue non; imò fortasse plus roboris ei accessurum, ubicunque decussatio ista concedatur.* Quibus verbis fateor me etiam respexisse ad *inversionem imaginis* in oculo, quæ tamen in cerebro percipitur in situ naturali; (quamvis ejusce quidem *Φαινόμενῃς* Mechanica solutio omnes Hypotheses perinde urget) & ejus explicatio, nisi fallor, utcun-

utcunque intelligatur ab experimento *Cæci* iudicium ferentis de positione objecti suprà se collocati; si alteram baculi extremitatem in manu tenens, alterâ tetigerit objectum de quo quæritur. Nam eodem planè modo in objecti cujuscunque prospectu, non tam judicamus de situ ejusdem, partiumve ejus, ope istius extremitatis *radii visivi* quæ in oculo terminatur, quam ejus quæ proximè contingit objectum ipsum, à quo initium ducit vibratio sive motus iste, qui in oculo metam sortitur.

Resp. titur. Sed omiffâ hujus rei confideratione (quæ omnes opticos juxtâ mecum premit) ad objectionem ipsam tranfeo, quatenus ea fententiam noſtram peculiari impetu arietat & impugnat; quæ quamvis primâ fronte, omnium quotquot hætenus adductæ ſunt, aut in poſterum adduci poſſunt, reſponſu difficillima videri poſſit, tamen *Achilleo more*, ipſa, quod inflixit vulnus, perſanabit. Remedium nempe petimus ex ipſo experimento, unde obſectio deſumitur, potiùs quam à figurâ, prout illa in
* ſche-

* schemate nostro exhibetur, ubi oculi non sunt in eo situ positi, qui requiritur ad hanc objectionem in ipsâ sui formâ ac specie repræsentandam. Ponas igitur objectum, si placet, juxta *oculum sinistrum* (ad eam tamen distantiam ab eodem, ut transitus radiorum ab eo versus *dextrum* ab intercipiente naso non impediatur) interea vero temporis, observet alius, id quod tu non potes, oculorum tuorum situm & positionem, & manifestè sentiet *pupillam dextri oculi* convertere se more ad-

modum obliquo & laterali versus objectum, (pupillâ interim sinistri, quæ, & ipsa se nonnihil versus objectum torquet, in situ propemodum naturali manente) quo fiet, ut distantia pupillæ dextræ ab externo cantho, (sicut ex *alba* utriusque simul conspecto judicari potest) triplo major existat quam sinistræ, ità ut oculus dexter se habeat ad sinistrum, uti in Fig. 2. ad calcem hujus tractatus appositâ repræsentatur.

a. *Objectum.*

b. *Sinister oculus.*

c. *Dex.*

c. *Dexter.*dd. *Pupillæ.*ee. *Duæ internæ-laterales fibræ.*ff. *Duæ externæ.*gg. *Nervi optici.*

Hinc satis constat, si
 objectum ita collocetur,
 ut ab utroque oculo si-
 mul conspici possit, dex-
 trum oculum sic se ac-
 commodare positioni si-
 nistræ, ut radii in utroque
 impingant in *concordes*
fibras; & cùm percussio
 siue vibratio eorundem * In
 fiat versus fundum vel *Oph-*
pupillam oculi, (vel, quod *thalm.*
 eodem recidit, juxtà e- *p. 28.*
vid. ib.
 jus axin,) ubi * priùs dixi- *f. in*
 M 7 mus *fig. 2.*

mus negotium visionis præcipuè administrari, sanè levicula quævis conversio vel contortio unius oculi versus alterū, efficiet ut alter alteri confestim se accommodet, & ut fibræ utrinque sint concordēs.

§. Porro non tantū in *obliquâ positione* objecti, verū etiam in *directâ* multò magis deprehenditur idem ille consensus, sive alternum fœdus oculorum, sicut experimento constat in objecto ab oculis rectâ recedente, in quo casu pupillæ paulatim divaricantur; sicut è contra, quo

quo minùs objectum ab oculis removeretur , eo propiùs pupillæ ad se invicem accedunt ; idque in objectis proximè distantibus , tam violentâ ac præternaturali contortione , ut illico lassatæ non possint in eo situ , sine dolore maximo , perseverare.

Ab hæc autem diversâ incidentiâ radiorum , nunc in laterales internas, nunc in externas fibras , (prout objectum propiùs oculo admoveatur , aut ab eodem longiore intervallo distat ,) variantes ipsarum distantiarum modi ac mensuræ,

furæ , ex ipsius naturæ monitu dignoscuntur, ut-
cunque objectum nihilo-
minus recedat in lineâ
rectâ, & eundem in re-
cessu fervet ad Horizon-
tem respectum cum ocu-
lis nostris. In Brutis eti-
am dum priua objecta si-
gillatim intuentur, eun-
dem consensum & ac-
commodationem videre
est; in iisdem tamen ra-
dii, propter optici ner-
vi *obliquam insertionem*,
libentius incidunt in *ex-
ternas fibras*; cujus rei
consequens est, ut non
tam citò oculos conver-
tant, neque motus obje-
ctorum tam facilè se-
quan-

quantur , ut nos homines solemus, neque *sphæra visionis* tam latè se diffundat , ut in humano genere.

‘ Sed ut pergamus ad ^{Ob-} alias objectiones; Quod ^{ject.}
‘ ad strabones attinet, ^{4^a.}
‘ *qui sic ab infantiâ fiunt*,
‘ quique sic affecti sunt.
‘ ex levi contortione aliqujus ex oculi *musculis*
‘ *motoribus* , de eâ re jam
‘ olim egimus in superiore tractatu , & simul ^{Resp.}
‘ offendimus , quare *strabismus acutitius* , sive
‘ ex morbo postmodum ingravescens , & ex violentâ contortione eorundem musculorum ,
‘ post

post convulsiones nervorum gravissimas oriundus, objecta semper duplicia repræsentet, (quo spectant etiam exempla ex *Willisio* nostro &c. ibidem loci adducta) quamvis hoc problema tam difficile *Plempio*, aliisque antè eum philosophis videbatur, ut de ejus solutione propè desperatum sit, neque sanè videtur omninò posse solvi, nisi ex istà Hypothesi, (absit verbo invidia) cujus mihi nunc primùm in publicum edendæ, post tot irritos & inutiles aliorum omnium conatus, fato

fato quodam facultas est concessa.

‘ 5. Obtenditur à qui-
 ‘ busdam , causæ nihil ef- *Ob-*
 ‘ se , quare fibræ nervo- *ject.*
 ‘ rum opticorum non sint *5^a.*
 ‘ uniformes , quoad ten-
 ‘ sionem suam , tamen si
 ‘ verum sit , id quod à me
 ‘ statuitur , superiores in-
 ‘ ferioribus magis infle-
 ‘ cti ; fieri enim potest ,
 ‘ ut aliæ aliis longitudine
 ‘ præstent , & consequen-
 ‘ ter ut par sit tensio in
 ‘ dispari flexione. Ex-
 ‘ empli gratiâ , si ramus
 ‘ arboris , dum crescit ,
 ‘ sensim incurvetur , ta-
 ‘ men curvitas ista non
 ‘ videtur facere , ut exti-
 ‘ mæ

‘mæ fibræ, ubi arcus est
 ‘productior’, *tensiores*
 ‘sint internis, sed tan-
 ‘tum ut longiores.

Resp. Respondeo, quicquid
 sit de arbore, contrarium
 hujus exceptionis in ce-
 rebro, ex ipso sensuum
 suffragio probari;
 nam si quis nervum opti-
 cum à thalamo suo tra-
 hat antrorsum, (ut fi-
 brarum tensionem in na-
 turali situ permanentium
 eo ritu observet) certo
 certius comperiet *supe-
 riores fibras*; lateralibus
 omninò graviùs incum-
 bere in subiacentes tha-
 lamos sive processus me-
 dullares, & in iisdem al-
 tiores

tiores sui notas seu impressiones relinquere.

Præterea , ut similitudinem similitudine ulciscar ; observare licet de fibris *musculorum* tibiam *extendentium* , ac transeuntium suprà *convexam* genu *partem* , quòd in actione suâ vegetiores fortioresque videantur quàm *contractantium* musculorum fibræ , quæ sub *flexurâ* vel *concavâ parte* decurrunt. Quo nihil clarius ostendit ineffabilem sapientiam optimi, maximique conditoris nostri, neque potentius obruit & pessundat *Epicuri* & Arguejus *men-*

tum
 de-
 mon-
 strati-
 vum in
 Epicu-
 reos, à
 mirâ
 mus-
 culo-
 rum
 tibia-
 lium
 in fortu
 huma-
 no po-
 sitione
 de-
 sum-
 ptum.

ejus asseclarum vanita-
 tem (qui docent, ut cæ-
 teram Universi molem,
 sic etiam partes corpo-
 ris humani *temerario*
casu coaluisse neque na-
 turam in ejus opificio vel
 adhibuisse consilium, vel
 spectasse finem:) nam
 cùm hi musculi *tibiæ ex-*
tensores, velut in cu-
 stodiâ habiti, impedian-
 tur in actione, dum ad-
 huc infans habitat in ute-
 ro matris, (nam per id
 temporis cogitur in or-
 bem, & sedet genibus
 in ora revolutis) defe-
 ctus iste optimè pensa-
 tur ab earundem fibra-
 rum situ & tensione, sine
 quâ

quâ recti incedere nunquam potuissimus.

• Non desunt, qui Hy. ob-
• pothesi nostræ sic se *ject.*
• opposuerunt ut dice-^{6a}.
• rent, actionem visio-
• nis uniformem esse, &
• idcirco fibras, quibus
• in eadem utimur, de-
• bere, ubicunque sint
• simili ritu extendi. Et
fateor quidem in *integri*
objecti vel in ejus loci
prospectu per *oculum u-* *Resp.*
trumque facto, planè, ut
illi volunt, fieri oportere;
nam omnis hujus-
cemodi visio objecto-
rum perficitur, uti sæpè
diximus, per *concordes*
fibras: sed in *obtutu mi-*
nuti-

nutiori partium ejusdem
objecti, *unius oculi du-*
ctu & auspiciis facto, &
in earundem partium ab
invicem secretione, re-
quiritur etiam in fibris
certissimum discrimen.
Nam ut instantiam de-
mus in corpore simpli-
cissimo & ejusdem per
omnia coloris, (quale sit
rubicundus aut *ignescens*
globus, ab uno tantum
oculo conspectus) cer-
tum est oculum non tan-
tum *unire partes*, ità ut
integrum objectum uno
eodemque tempore cer-
natur, sed & *distinguere*
partem extrà partem, &
servare eundem respe-
ctum

ctum in visione , quem illæ foràs habent inter seipsas. Quod si non faceret , fieret profectò ut *integer ille globus* ex omni sui parte in idẽ cerebri punctum terminatus , non nisi *puncti lucidi* aut *rubri* speciem referret ; sed *distinctio naturalis* facilè servatur , si partes objecti , sicut sunt à se invicem sine dubio distinctæ , ità emittant ex se radios incidentes in ejusdem oculi *discordes fibras*.

‘ Denique , obtendunt *ob-*
 ‘ alii , iique non de plebe *ject.*
 ‘ philosophorum viri , si- 7^a.
 ‘ bras *Choroëidis* aptio-

N

‘ res

res esse visioni pro-
 ducendæ , quàm eas
 quæ in *retinâ* reperiun-
 tur ; causam afferunt ,
 quia *retinâ* non sistit
 species sed transmittit
 colores *choroëidis* ; præ-
 terquam quòd *vasa san-*
guifera quæ inter reti-
 næ fibrillas transire de-
 prehendantur in hoc
 casu interciperent &
 frangerent imagines ob-
 jectorum ; & quòd de-
 nique sensatio commo-
 diùs videtur propagari
 posse ad tenfas fibras
piæ matris per *choroëi-*
den , quàm ad cerebrum
 per *medullares* & ferè
 intensiles tunicæ reti-
 formis.

Hæc

Hæc autem objectio *Resp.*
 quamvis nostram de vi-
 sione sententiam directè
 non impugnet (nam *con-*
gruentia , qualem nos
 statuimus in utrâque re-
 tinâ , *fibrarum* intelligi
 potest etiam in *choroëi-*
de) tamen , quia diximus
 in superioribus , id quod
 nondum piget dixisse,
visionem nullo modo
 commodiùs & rectiùs ,
 quàm per *fibras retinæ*
 præstari posse , (quam-
 vis *alii* fortassè *sensus* ad
 actiones suas desiderent
 duriores , *rigentioresque*
membranas , quas qui-
 dem membranas Recen-
 tiores quidam scriptores

unica sentiendi instrumenta esse volunt) idcirco non minoris momenti fore arbitror, ut res ista novo examini subji-
ciatur.

Primò igitur certum est, quod suprà observavimus, *retinam* nihilo magis, imò vix tantopere pellucere, quàm in laternâ *papyrus oleo perfusa*, quæ tamen interceptit & ostendit *formas umbratiles* longo ordine per eam transeuntes. 2. *Retina* cùm ad alborem proximè accedat, & in eo probè imitetur *chartam albam* in camerâ obscurâ constitutam, naturali-

ralitèr aptior est recipiendis imaginibus objectorum coloratorum, quam *opaca umbra choroëidis*. 3. Quando *retina* nihil aliud sit, quam *interna & medullaris expansio optici nervi* (ut paulò suprà monuimus) faciliùs & immediatiùs transmittit motuum impressiones *meditullio cerebri*, sive communi sensorio, quàm *choroëides*, quæ cum *piâ matre* continuata sensorium non attingit; id quod cùm olim à me in patrocinium impugnatæ Hypotheseos adduceretur, nondum tamen vel *Ma-*

riottus ipse, vel, ex fe-
 quacibus ejus, ullus,
 quod sciam, huic re-
 sponcioni quidquam op-
 posuerunt, 4. *Vasa san-*
guifera suprà retinam
 transeuntia, non minus
choroëidi, quàm illi ad-
 versantur; nam si cho-
 roëides *plexus* non sit
istiusmodi vasorũ (quem
 admodum nonnulli nu-
 per probabilibus ratio-
 num momentis innixi as-
 seruerunt) tamen cùm
ipsi retinae subiecta sit,
 etiam ut vasis prædictis
 sanguiferis suprà eam
 transeuntibus subjaceat,
 necesse est. Quocirca ex
 hac objectione id solum-
 modò


modò conficitur non esse in *omni oculi positione* (propter vasorum prædictorum decursum) æquè perfectam objecti repræsentationem; quod *experimento Mariotti* Objectioni D. Mariotti, *no* conceditur, & verum esse potest, Hypothesi nostrâ integrâ permanente. 5. Quod ad *fibrarum tensionem* spectat, occurritur. monui jam olim non minùs extendi *retinæ* fibrillas quam eas quæ in *arane telâ* reperiuntur; & hoc omninò sufficit, imò longè aptius & accommodatius est, lenissimis impulsibus *materiæ æthereæ seu lucidæ* & operatione.

rationibus hujus sensus præ omnibus aliis longè subtilissimis minutissimisque, quàm si eadem fibræ duriores robustioresque fuissent; quid quod eadem objectio non minùs militat contrà *cerebrum ipsum*, quod & ipsum *fibras molles* ac delicatulas habet, idoneas nihilominùs cuicunque motui recipiendo propagandoque; quæque (dum spiritibus animalibus replentur) possunt eandem *tensionem* & elasticam vim obtinere, ac *lanæ manipulus* vel araneæ tela. Et, si per similitudines argumen-

mentari liceat; Ut *minutum istud animalculum*, in *centro fibrarum* circumambientium positum, persentiscit lenissimas quascunque auras quâcunque plagâ temerè spirantes; & prædæ inhians, aut ab hostibus cavens minimos eorundem atque primos motus, per fibrarum expansionem delicatulam, & minimâ quâvis impressione læsam ac tremebundam cognoscit: sic *anima nostra* multò magis in *communi sensu* *Unde anima distinguit Motus* circumsepta & obsessa ambientibus fibrillis tenuioris & opportuno-

etorum ris ad omnem undecun-
per or. que auram contextûs ap-
gana prehendit & intelligit
sen- motus omnes ex omni
suum quacunque plagâ venien-
com- tes, & minutiùs judicat
muni de differentiis eorum,
sensu- respectu habito ad di-
rio versa organa *sensuum di-*
trans- *versorum*, & diversam
missos. tenuitatem sive tensio-
 nem nervorum, quorum
illi ope ac ministerio u-
 tuntur.

Obfer-



*Observatio insignis, quæ
sententiam priorem
confirmat.*

Examinatis hoc ritu
objectionibus, quæ
sententiam nostram im-
pugnant, addam nunc
solummodò unicam ob-
servationem, quæ se mi-
hi ultrò obtulit in No-
comio *D. Thomæ*, (ubi
serenissimi Regis indul-
gentiâ : unâ cum Do-
ctissimo collegâ & Ami-
co *Gulielmo Dawkins*,
M. D. & Collegii Medi-
corum

corum focio , ægrotæ paupertati , quam possum opem , & subsidium præsto) quæ præcedentem nostram de visione sententiam egregiè adstruit & confirmat.

Erat autem casus hujuscemodi ; *Daniel Wright* annum agens undevigesimum , temperamento sanguineus & plethorâ gravis , circa exitum anni 1683. vertigine corripiebatur ; cui etiam accesserant dolores crebri in capitis mediâ ac supremâ parte , circa *falcis* regionem. Juvenis de morbi sui causâ procatacctica interrogatus,

gatus, aliam se nullam
scire affirmabat, præter
cæli inclementiam; quæ
tum temporis diuturno
frigore grassata, fecerat
ut ipsi propè spiritus &
humores nostri in gla-
ciem converterentur.
Accidit autem pessimè,
cum esset sic affectus, ut
ad *Sciolum quendam* se
conferret ex Empirico-
rum grege; qui ad per-
niciem humanam nati,
magno mortem & igno-
rantiam, in hâc urbe
passim divendunt. Is ca-
piti (prætermiſſis evacu-
antibus remediis) empla-
strum illicò applicandum
dedit, sed siue fuerit

Empl. *Cephalicum cum Euphorbio*, quale reperitur in *Dispensatorio Londinensi*, siue quodcunque aliud tandem fuerit, non potui quærendo indagare, Tantum autem abfuit ut in hoc emplastro quicquam esset præsidii, ut statim ab ejus usu dolores capitis magnoperè ingravescerent, non modò crebriores facti quàm antea fuissent, sed (ut arbitror, propter spasmos & *constrictiones Mèningum*) acutiores; quos illicò sequebantur *motus convulsivi* (cum brachiorum & crurum *paralytico tremore*

more paulò post conjuncti) & postquam hoc morbo aliquandiu laborâisset, omnia illi *objecta duplicia* videbantur; nempe, ex eo quod *fibræ nervorum optidorum* violento motu hoc ritu *distortæ*, recedere cogerentur à parallelismo suo.

Misellus ille per trimestre spatium Empirico simul & morbo laborabat; deinde cùm in eo nihil jam spei amplius vel salutis esset, (nisi salus illa spesque unica & ultima miserorum, salutem nullam sperare) quasi ultimum & unicè jam sibi in

in extremâ vitæ tegulâ
constituto relictum îpei
salutisque deploratę per-
fugium, nosocomii nostri
hospitio est exceptus.
Statim ab adventu ejus,
agrum adii, & in morbi
ejus causam & naturam
anxiè cœpi inquirere; &
suspicebar fanè, id quod
res erat (cùm cuncta illi
objecta duplicia cerne-
rentur,) *nervos opticos*
proculdubiò affectos es-
se; eamque affectionem
eoufque processisse, ut
gutta serena jam in pro-
pinquo staret. Neque
eventus fefellit conje-
cturam meam, sed quod
præsenferam, brevi com-
pro-

probavit; & fecit ut neque tunc pigeret, neque certè etiamnum pigeat, novæ Hypotheseos circà visionem, quam Regiæ societatis trutinæ submissem.

In casu hoc deplorato (ubi paroxysmi quotidie graviores redirent, & quidem plures eodem die æger perferret, ità ut palàm profiteretur, quid de se fieret, nihil se curare, & emori longè quam vivere præoptaret) quicquid in nobis opis aut auxilii erat, maximâ quâ potuimus fide ac diligentia, impensum est. Præscripsimus itaque pilulas

pilulas Cephalicas, me-
 dicamenta antispasmodi-
 ca, & electuarium quod-
 dam, quod solenne est
 nobis in Nosocomio no-
 stro Epilepticis propina-
 re; quæ illi aliquandiu
 non parum profuerunt.
 Quinetiam sanguis illi
 missus est, admotis hi-
 rudinibus, per opportu-
 na temporum intervalla;
 ex venis *Hæmorrhoidæ*
 & *jugulari*, cum insigni
 levamine: capillitium
 porrò rasum est, vesica-
 toria cervici apposita; &
 fetaceum paulò post in
 eâdem factum; id agen-
 tibus nobis, ut omni quo
 possemus *revulsionum*
appa-

apparatu, humores aliò diverteremus. Sed frustra; nam illi nimis altas egerant radices, & labem immedicabilem nervis inflixerant; vix duo itaque menses effluerant, postquam se nobis permiserat medendum (nonnunquam non sine aliquâ spe convalescendi) cùm eccè *gutta serena* dextro oculo de repente offusa, visum ex eâ parte penitus interclusit; ex eo autem tempore, *duplicitas illa*, quam diximus, evanuit. & objecta nunc iterum *simplicia* cernebantur, quod adhuc fortius adstruit

struit. opinionem nostram.

Sed extincto dextro lumine, etiam sinistrum periclitabatur; igitur (præter continuationem priorum medicamentorum & electuarii) fonticulum jussimus aperiri, juxta concursum suturarum *Lambdoidis* & *Sagittalis*, ut & applicari cucurbitulas humeris cum scarificatione; ut ex iis, quæ arbitrabamur ad ingruentis mali remedium pertinere, nihil intentatum prætermitteretur. Sed ut postea rescivimus, cucurbitæ admotæ non sunt; & interea

reà dum nos de sinistro oculo solliciti diligentissimè cavemus , nè casum alterius extincti sequeretur , hospes noster gravi paroxysmo spasmodico correptus , vitam cum morte subitò commutavit.

Fortè evenit , ut cùm ille vitâ excederet , ego ab ægroto quodam , extrâ urbis pomoeria laborante arcessitus , in suburbano rure versarer ; ita ut , ignarus cùm essem ejus quod acciderat , inspectionis Anatomicæ opportunitas , quæ mihi certè , post hominis convalescentiam , proximè in votis erat ,


erat , è manibns elaberetur. Interrogati verò de eo , qui mortuum aspexerant , retulerunt in *collo & humeris*, paulò post quàm fato concessit, *nigrorem* intensissimum apparuisse (ut puto , à sanguine in iisdem locis stagnante) quod manifestissimè ostendit , ea quæ à nobis ultimò præscripta sunt , quæque fieri iussimus per complures dies priusquam moreretur , morbo ejus imprimis accommoda ac necessaria fuisse.

Quem exitum vel *Trypanum* vel *salivatio* fuissent habitura , non sumus

mus experti ; quamvis eorum alterum optimè succedat ubi materia morbifica extravasata acredine suâ membranas convellit , alterum in capitis *doloribus Venereis*. Verùm dolores capitis, quos noster perferebat , nec erant constantes nec *nocturni*; & ille , quotiescunque eum de antecedentibus morbi sui causis enixè interrogabam , nihil sibi intercessisse cum *Venere* negotii constantissimè asseverabat. Et profectò , cùm viderem eum valetudinis recuperandæ desiderio tantoperè flagrare ; recusare

cufare nihil eorum , quæ
 illi ad fanitatem propi-
 narentur ; & eſſe præte-
 reà, (quoad mores & vi-
 vendi rationem) juve-
 nem vitæ integrum &
 moribus inculpatis ; pia-
 culi loco duxi (tàm fo-
 brius & frugi, & prætereà
 candidus ingenuuſque
 cùm eſſet) abrogare illi,
 quam ſuo jure mereri vi-
 debatur , fidem ; præſer-
 tim cùm perpetuò obſer-
 varemus ægrum nun-
 quam acuto iſto & *con-*
ſtringente capitis cru-
 ciatu vexari , niſi , per id
 temporis , dum paroxyſ-
 mi hi ſpaſmodici eundem
 torquerent.

INDEX



a Fibra Suprema
b Fibra infima.
c Nervi Optici portio.

INDEX

S I V E

Operis Distributio & Methodus.

Propositi Ratio , pag. [179](#). Relatio ad Ophthalmographiam præmissam, pag. [181](#). *Difficultas* , pag. [182](#). Operis infecuturi ratio , p. [184](#). Peculiaris fibrarum Opticarum Exortus & flexura , p. [186](#). Rei illustratio , p. [187](#). Fibrarum Opticarum tensio gradualis in eodem thalamo , p. [188](#). Fibrarum in utroque respondentium , situs & tensio similis , p. [189](#). Distinctus earum in cerebro exortus , p. [191](#). Earum parallelismus seu situs uniformis , p. [192](#). unde sensatio simplex in duplici nervo optico. p. [193](#). fibrarum ordo servatur per connexionem nervorum , p. [194](#). Nervi Optici nec decussant invicem , nec coalescunt , p. [195](#). insignes instantiæ hoc evincunt , ibid. fibrarum parallelismus etiam per situm musculorum adjuvatur ,
O [P. 197.](#)

I N D E X.

p. 197. Summi Conditoris stupendum artificium in muscutorum obliquorum positione , p. 202. Quomodo muscoli recti huic parallelismo inserviunt , p. 203. fibrarum insertio in oculum sententiam nostram confirmat , p. 205. earum distincta expansio in Retinâ per novum experimentum ostenditur , p. 206. Unde visio fit simplex à duplici organo. p. 208. Visio perfectior fit ab utroque oculo , contra Gallendi sententiam , p. 210. Responsio ad objectionem , p. 211. Unde objectum duplex apparet ab oculo depresso , p. 213. Objectioni occurritur , p. 215. Instantia insignes ad confirmandam hypothesein , p. 218. &c. Unde oculi ad obtutum objectorum remotorum , quàm propinquorum , magis delassantur , p. 224. Hypotheseos nostra ulterior explicatio , ut objectionibus quibusdam occurratur , p. 227. unde fit , quod duplicitas oritur à strabismo præter-naturali ; à naturali non item , p. 230. Continuatio Theoriæ , operi insecuturo commodè præmittenda , p. 238. ejusdem elucidatio ,

I N D E X.

datio, p. 240. *Ex præmissis observatio prima*, p. 241. *Secunda*, p. 242. *Tertia*; ubi *objectioni* occurritur, p. 244. *Quarta*, p. 245. *Cur tam exquisitus fibrarum Opticarum, præ aliis, apparatus*, p. 246. *Observatio quinta*, p. 247. *Quare in piscibus minoribus & quibusdam aliis animalculis Nervi optici non tam arte ununtur ac in homine*, p. 249. *Observatio sexta*, p. 250. *Objectioni D. Mariotti occurritur*, p. 254. *Observatio septima*, p. 257. *Octava*, p. 259. *Objectiones sententiam nostram impugnantes expenduntur*, p. 261. *Obiectio prima*, p. 262. *Secunda*, p. 267. *Tertia*, p. 271. *Quarta*, p. 181. *Quinta*, p. 283. *Argumentum demonstrativum in Epicureos à mirâ muscutorum tibialium (in fœtu humano) positione desumptum*, p. 285. *Obiectio sexta*, p. 287. *Unde partes corporis simplicissimi (seu per omnia similis) quoad situm diversimodè apparent*, p. 288. *Obiectio septima*, p. 289. *Argumentis plurimis probatur Retinam visioni magis accom-*
modam

I N D E X.

*modam esse, quàm Choroeiden; contra
sententiam D. Mariotti, p. 293. &c.
Ejusdem objectioni primaria occurritur,
p. 295. Unde anima distinguit multipli-
ces objectorum motus, per organa sen-
suum Comuni sensorio transmissos,
p. 297. Observatio insignis, qua sen-
tentiam nostram confirmat, p. 299. &c.
ad finem.*

CATA-

CATALOGUS LIBRORUM
PETRI vander Aa,

Designans libros , qui tam ejus ty-
pis & impensis prodierunt, quam
quorum alias Copia ipsi sup-
petit.

Joh. Alph. Borellus de Vi Percussionis,
Motionibus Naturalibus à gravita-
te pendentibus , sive Introducti-
ones & Illustrationes Physico-
Maticæ apprimè necessariæ
ad opus ejus intelligendum de mo-
tu animalium , unâ cum ejusdem
Auctoris Responsionibus in anim-
adversiones Illustr. Doctiss. Viri
Dni Stephani de Angelis ad li-
brum de Vi Percussionis , in *Quar-*
to, 1686. 2. voll. cum figuris æ-
neis.

Ejusdem de Motu animalium , in
Quarto, 2 voll. cum figuris æneis
1685.

CATALOGUS

Cajus Valerius Catullus & in eum Isaaci Vossii Observationes in Quarto. 1684.

Lup. de Bebenburg de Jur. Regni & Imp. Romanorum, & Freherus de Coronatione, in Quarto. 1664.

La Pratique de la Médecine selon les Anciens & Modernes, deux Tomes 1686. s'imprimé.

Johann. Seldenus de anno Civili Veterum Judæorum & Jac. Usserius de Macedonum & Asianorum anno Solari. in Octavo 1683.

Jacobi le Mort Pharmacia Medico-Physica, Rationibus & Experimentis Instructa. Accuratiore Methodo adornata, nec non Observat. Medicis Illustrata. In Octavo 1684.

— *Ejusdem Chymia Medico-Physica, Rationibus & Experim. Instructa, Brevis & facili viâ Processus Spagyricos ritè & artificiosè ad finem perducendi, normam exhibens. Cui annexa est Metallurgia contra-*

LIBRORUM.

contracta , succinctam Metallo-
rum tractationem demonstrans. In
Octavo. 1684. cum figur.

Joh. Bapt. de Lamzveerde Naturalis
Molarum Uteri Historia , in qua
accuratius de Natura Seminis ejus-
que circulari in sanguine regressu ,
modo conceptionis & generationis
ac ovis humanis disquiritur. In
Octavo cum figuris æneis, sub prælo.

Henrici Mundi Opera omnia Me-
dico-Physica , tractatibus tribus
comprehensa , de Aëre Vitali , de
Esculentis , de Potulentis , una
cum appendice de Parergis in Vi-
ctu ut Chocolata , Caffè , Thea ,
Tabaco &c. In Octavo 1685.

Guilj. Briggs Ophthalmographia ; sive
oculi ejusque partium Descriptio
anatomica & Nova visionis The-
oria, Regiæ societati Londin. pro-
posita. In Duod. 1686. cum fig.

Cosmopolita Historia Naturalis com-
prehendens Humani Corporis A-
tomiam & Anatomicam delinea-
tionem

CATALOGUS

tionem ab ipsis primis foetus rudimentis in utero usque ad perfectum & adultum statum lumine præclaro Generationem Hominis & efformationem exhibens dein usum & structuram omnium vasorum in eodem perfecto summa cum arte demonstrans, opus nulli Medicinæ Curioso vel studioso non conveniens. In Duodecimo. 1686.

Philippi Reinh. Vitriarii Institutiones juris publici, In Duodecimo. 1686.

Anth. Nuck de ductu salivali novo, saliva, Ductibus oculorum aquosis & humore Oculi aqueo. In Duodecimo. 1686. cum fig.

Tractatus varii & curiosi de aquis Medicatis. In Duodecimo, 4. voll. 1685. cum figuris.

Job. Muys, Praxis Chirurg. Rationalis, seu Observat. Chirurgicæ secundum solida veræ Philosophiæ fundamenta resolutæ quinque Decades. In Duodecimo. 1685.

~~-----~~ Du-

LIBRORUM.

— Decas quinta. *In Duodecimo*,
1685. separatiim.

Henr. ab Heers Spadacrene hoc est
fons Spadanus, accuratissimè descri-
ptus, acidulasque bibendi modus
& medicamina oxypotis necessaria
ut & Observationes Medicæ oppi-
do raræ in *Spa* & *Leodii* animad-
versæ, cum Medicamentis aliquot
selectis, & ut volunt secretis. E-
ditio novissima auctior. *In Duode-
cimo*. 1685. 2 voll.

D. Du Clos Observationes super *Aquis
Mineralibus* plurimarum Pro-
vinciarum Galliæ, in Academia
Scientiarum facta, & Dissertat. de
mixturenibus naturalibus. *In Duodeci-
mo*. 1685.

Guilj. Bradshaw Dissert. de Justificat.
Doctrinæ, qua via plana munitur
ad eorum concordiam qui hac de re
variarunt. *In Duodecimo*. 1684.

Vienna eliberata. *In Duodecimo*. 1684.
cum figuris.

Matth. Movii Felix Puerpera seu Ob-
servat.

CATALOGUS

fervat. Medicæ , circa regimen
Puerperarum & Infantium Re-
cens Natorum. *In Duod.* 1684.

Frid. Hoffman. Exercitatio Medico-
Chymica de *Cinnabari Antimonii*
ejusque eximiis Viribus , usuque in
mentio secretiori , quo illo via ex
illa veram panæacam conficiendi
aperitur. Adjecta sunt Experimenta
ac Ratiocinia varia curiosa. *In*
Duodecimo. 1685.

G. B. de St. Romain Physica sive
Scientia Naturalis Scholasticis tri-
cis liberata, opus novum curiosis
plurimis , ex Medicina & Chymia
depromtis Experimentis , nec non
observationibus nonnullis ad cor-
poris sanitatem utilibus adornata.
In Duodecimo. 1684.

Traité de l' Action de l' orateur ou de la
Pronuntiation & de geste , par le sieur
Conrart Secrétaire de l' Académie
Francoise , En Douze. 1686.

Nouveau Recueil des Curiositez rares &
nouvelles des plus admirables effets de
la na-

LIBROLUM.

la nature , de l' art, composé de quantité de beaux secrets Gallans & autres: dont quelques uns ons été tirez du Cabinet de feu Mons. Le Marquis de l' Hôpital. Expérimentez & composez par le Sieur de Lemery. In Duodecimo. 2 voll. avec figures 1685.

Anatomie des Plantes , qui contient une Description exacte de leur , parties & de leurs usages , & qui fait voir comment elles se forment & comment elles croissent par Mr. Nehem. Grew, & l' Ame des Plantes par Mr. Dedu avec un Recueil d' Expériences , & observations curieuses par Mrs. Grew & Boyle. In Duodecimo. 1685. avec figures.

Traité des plus belles Bibliothèques de l' Europe, des premiers livres qui ont été faits, de l' Invention de l' Imprimerie , des Imprimeurs. de plusieurs livres qui ont été perdus & recouvréz par les soins des scavans, avec une Méthode pour dresser une
Bibli.

CATALOGUS LIBROR.

Bibliothèque par le Sieur le Gallois.

In Duodecimo 1685.

La Bête transformée en machine, divisée en deux Dissertations. par le Sieur J. Darmanfon. In Duodecimo. 1684.

Histoire du Wiclesianisme ou Vies de Wiclef, Jean Hus & Jerome de Prague. In Duodecimo. 1683.

Essais d'Anatomie, ou l'on explique clairement la construction des Organes & leurs Operations mécaniques selon les nouvelles hypotheses par . . . Docteur en Médecine. In Duodecimo. 1686.

— *Idem Latine. In Duod. sub prælo.*


La Compagnie agreable, contenant toute sorte d'Histoires Galantes, curieux divertissemens & autres plaisantes narrations pour chasser la Melancholie, & faire parler agreablement le temps à la Compagnie. In Duod. 1685.

F I N I S.

AOL

1460793







K. 54.

XXV
A-A